史載之方

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



史載之方

史堪撰

本館據十萬卷樓
叢書本排印初編
各叢書僅有此本

史載之方

史載之傳

史堪。字載之、蜀人。書錄解題 治病用藥。初不求異。炮炙製度。自依本法。審證精切。不過三四服。立癒。載之方歐 眉州人彭師古。年三十時。得異疾。不能食。聞葷腥氣輒嘔。惟用一鐺旋煮湯。沃淡飯數匙食之。食已。鼻中必滴血一點。懨懨疲削。醫莫能愈。乃趨郡謁堪。堪曰。君之疾在素問經中。其名曰食掛。凡人肺六葉舒張如蓋。下覆於脾。則子母氣和。飲食甘美。一或有戾。則肺不能舒。脾爲之蔽。故不嗜食。素問曰。肺葉焦熱。名曰食掛。蓋食不下脾。瘀而成疾耳。遂製藥服之。三日覺肉香。啖之。無所苦。自此嗜食。宿恙頓除。宋稗類鈔 蔡元長苦大腸祕。醫不能通。堪診脈已曰。請求二十錢。元長曰。何爲。曰。欲市紫苑耳。末紫苑以進。須臾遂通。元門大驚。問其說。曰。大腸、肺之傳送。今之祕。無他。以肺氣濁耳。紫苑清肺氣。此所以通也。北窗炙錄 輒著有指南方二卷。凡分三十二門。門各有論。解題

陸氏曰。史堪、里貫無考。據書錄解題。知爲蜀人而已。蜀有史崧。見蜀中廣記。亦以醫名。其卽堪之一家歟。

余旣刻其書。因摭諸書而爲之傳。

史載之方卷上

宋 史堪撰

四時正脈

春

春脈弦。其氣來柔軟弱虛而滑。端直以長。名之曰弦。反此者病。其氣來實而強。名爲太過。病在外。其氣來不實而微。此爲不及。病在中。太過則令人善忘忽忽。冒眩巔疾。不及則令人胸痛引背下兩脅肫滿。

夏

夏脈鈎。其氣來盛去衰。反此者病。其氣來盛去亦盛。此爲太過。病在外。其氣來不盛、去反盛。此爲不及。病在中。太過則令人身熱而膚痛。爲浸濕。不及則令人煩心。上見欬唾。下爲氣泄。

秋

秋脈浮。其氣來輕虛以浮。其氣來急去散。故曰浮。反此者病。帝曰。何如反。其氣來毛而中央堅。而兩旁虛。此謂太過。病在外。其氣來毛而微。此謂不及。病在中。太過則令人逆氣而背痛。愠愠然。不及則令人喘呼吸少氣而欬。上氣見血。下聞病音。

冬

冬脈營。其氣來沉而博。故曰營。反此者病。其氣來如彈石者。此謂太過。病在外。其去如數者。此謂不及。病在中。太過則令人解㑊。脊脈痛而少氣。不欲言。其不及則令人心懸。如病飢。胷中淸。脊中痛。少腹滿。小便變。

中

脾無善脈。止見惡脈。蓋脾脈以和緩爲主。故四時之脈雖不同。春脈弦。夏脈鈎。秋脈毛。冬脈營。皆要有脾脈。若脾脈不見。便是五藏眞脈見。眞脈見者死。所以脾無善脈者。謂其常脈便是吉脈。其太過不及。皆爲病脈。太過則令人四肢不舉。其來如水之流者、太過也。濕勝則然耳。不及則令人九竅不通。名曰重強。其來如鳥之啄者、不及也。土不用事則然耳。濕勝而其脈如流。邪乃傷腎。土不用事而九竅不利。因受木所制。木制則脾受水矣。九竅不利。故多生浮腫脹滿之疾。久而成水。

眞脈

眞肝脈至。中外急如循刀刃。責責然。如按琴瑟絃。色青白不澤。毛折。乃死。眞心脈至。堅而博。如循薏苡。累累然。色赤黑不澤。毛折。乃死。眞肺脈至。大而虛。如以毛羽中人膚。色白赤不澤。毛折。乃死。眞腎脈至。博而絕。如以指彈石。辟辟然。色黑黃不澤。毛折。乃死。眞脾脈至。弱而乍數乍疎。色黃青不澤。毛折。乃死。

厥陰所勝生病

運氣所勝

飧泄食減。體重煩寃。腸鳴。腹支滿。甚則忽忽善怒。眩冒巔疾。脇痛而吐甚。衝陽絕者、不治。

司天所勝

體重。肌肉萎。食減口爽。目轉耳鳴。胃脘當心而痛。飲食不下。舌本強。食則嘔。飧泄。腹脹。溏泄。瘕水閉。

在泉所勝

酒淅寒如瘧。善伸數欠。心痛支滿。兩脇裏急。飲食不下。鬲咽不通。食則嘔。腹脹善噫。得候與氣。則快然如衰。身體皆重。

少陰所勝生病

運勝

瘧。少氣欬喘。血溢。泄。注下。嗌燥。耳聾。中熱。肩背熱。

天勝

喘嘔。寒熱。嚏。鼽衄。鼻窒。甚則瘡瘍。脇痛。善太息。胸中煩熱。嗌乾。右胠滿。皮膚痛。寒熱。欬喘。唾血。鼽衄。溺色變。瘡瘍。附腫。肩背臂臑及缺盆痛。

地勝

腹中常鳴。氣上衝胸。喘。不能久立。寒熱。皮膚痛。齒痛。頰腫。惡寒發熱如瘧。少腹中痛。腹大。

太陰所勝生病

運勝

腹痛。清厥。意不樂。體重煩寃。肌肉萎。足萎不收。行善瘈。脚下痛。飲發中滿。食減。四支不舉。腹滿。溏泄。腹鳴反下。甚而大惡絕者、不治。

天勝

胸中不利。陰萎氣大衰而不起、不用。當其時。反腰脽痛。動轉不便。心下否滿。少腹痛。時害於食。附腫。骨痛。陰痿。陰痿者、按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。陰氣不用。飢不欲食。咳唾則有血。心如懸。

地勝

飲積。心痛。耳聾。渾渾焞焞。嗌腫。喉痺。陰病血見。少腹痛腫。不得小便。病衝頭痛。目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。膕如結。腨如別。

陽明所勝生病

運勝

兩脅下少腹痛。目眥痛。眥瘍。耳無所聞。體重煩寃。胸痛引背。兩脇滿。且痛引少腹。甚則喘逆氣咳。肩背痛。尻陰股膝髀踹胻足皆病。

天勝

脇痛。目赤。掉振鼓慄。筋痿。不能久立。小便變。寒熱如瘧。甚則心痛。左肢脇痛。寒清于中。感而瘧欬。腹中鳴。注泄。鶩溏。心脇暴痛。不可反側。嗌乾。面塵。腰痛。丈夫癪疝。婦人少腹痛。目昧。背瘍。瘡痤。

地勝

昏病喜嘔。嘔有苦。太息。心脇痛。不能反側。甚則嗌乾面塵。身無膏澤。足外反熱。

太陽所勝生病

運勝

身熱煩。心躁悸。陰厥。上下中寒。譫妄。心痛。甚則腹大。脛腫。喘欬。寢汗出。憎風。

天勝

心熱煩。嗌乾。善鼽嚏。喜悲。數欠。熱氣妄行。善忘。甚則心痛。嘔血。血泄。鼽衄。善悲。□□時眩仆。腹滿。手熱。肘攣。掖腫。心澹澹大動。胸脇胃脘不安。面赤目黃。善噫。嗌乾。甚則色焰。渴而飲。

地勝

少腹控睾引腰脊。上衝心痛。血見。嗌痛。頷腫。

少陽所勝生病

天勝

欬嚏鼽衄。鼻窒。瘍。寒熱。附腫。心痛。胃脘痛。厥逆。鬲不通。熱上。皮膚痛。色變黃赤。傳而爲水。身面附腫。腹滿。

仰息。泄注赤白。瘡瘍。唾血。煩心。胸中熱。甚則鼽衄。

地勝

注泄赤白。少腹痛。溺赤。甚則血便。少陰同候。

六氣復而生病

厥陰之復

少腹堅滿。裏急暴痛。心痛汗發。嘔吐。飲食不入而復出。筋骨掉眩。清厥。甚則入脾食痺而吐。

少陰之復

燠熱內作。煩躁鼽嚏。少腹絞痛。火見燔焫。嗌燥。分注時止。氣動於左。上行於右。欬。皮膚痛。暴瘖。心痛。鬱冒不知人。迺洒淅惡寒振慄。譫妄。寒已而熱。渴而欲飲。少氣。骨痿。膈腸不便。外爲浮腫。噦噫。瘡瘍。癰痤。甚則入肺。欬而鼻淵。

太陰之復

體重中滿。食飲不化。陰氣上厥。胸中不便。飲發於中。欬喘有聲。頭頂痛重而掉瘛。尤嘔而密默。唾吐清液。甚則入腎。竅泄無度。

少陽之復

驚瘛。欬衄。心熱煩躁。便數憎風。厥氣上行。面如浮埃。目而瞤瘛。火氣內發。上爲口瘡。嘔逆。血溢血泄。發而

爲瘧惡寒鼓慓寒極反熱嗌絡焦槁渴引水漿色變黃赤少氣脈萎化而爲水傳爲浮腫甚則入肺欬而血泄。

陽明之復

病生胠脇。氣歸於左。善太息。甚則心痛。否滿。腹脹而泄。嘔苦。欬噦。煩心。病在鬲中。頭痛。甚則入肝。驚駭筋攣。

太陽之復

心胃生寒。胸中不利。心痛。痞滿。頭痛。善恐。時眩仆。食減。腰脽反痛。屈伸不便。少腹控睪引腰脊。上衝心。唾出清水。及爲噦噫。甚則入心。善忘善悲。

論六氣所生之病

五行之爲病一也。而所生之氣不同。如木之所至爲風化。而病之生不獨止於肝。火之所至爲熱化。而病之生不獨止於心。此司天司地統歲紀運之不同。故爲病亦從而各異。又有乘年之虛。過月之空。失時之和。或勝而所勝受刑。或復而制於所勝。且以經言之。天火下臨。則肺氣上從。則白起金用。而草乃眚。燥氣下臨。則肝氣上從。則蒼起木用。而土乃眚。以常所勝而論之。則火至而肺病。金至而肝病。今也。天火下臨。則金以從天之氣而白迺用。故病反生於肝。天金下臨。則木從天之氣而蒼迺用。故病反生於脾。類舉而推。則厥陰司天。脾氣上從。而水斯眚。太陽司天。心氣上從。而金斯眚。少陰司天。肺氣上從。而肝斯眚。太陰

司天則腎氣上從而火斯眚。皆可知矣。此天度之尊。獨異於他經言。天能制色。以其能制勝己。而使不爲害。至於司地。則氣化之正。各隨其證耳。若夫紀運之歲之不同。則又視其司天之氣化。如六甲之歲。陽土當運。有陰凝流衍之布。宜與六己之歲不同也。然己巳、己亥。與六甲之歲同。六庚多肝病。而庚寅、庚申之歲。金不能制肝。六戊多肺病。而戊辰、戊戌之歲。火不能害肺。氣化所至。譬如權衡。可卽其氣以求其病。惟勝復之候不同。難以前期。亦隨其氣之多寡。以求其證。勝之爲病輕。復之爲病重。勝則所不勝者順受其克。復如報怨仇焉。此又不可不知也。今以木之受病。本於肺金之所制。則不過如肺氣有餘。凌犯於肝。生眼昏背癢耳無所聞。胸痛體重之病耳。若迺木化之盛。肝氣妄行。大傷於脾。則金必相救。邪反傷肝。能使人體重煩寃。胸痛引背。兩脅滿。宜痛引少腹。故經言上應太白星者。謂金之復也。雖然。人之氣、猶之天地之氣。五藏之氣。卽五運之氣。三陰之氣。卽六氣之變。顧一身之氣、多寡之如何。亦不必因天地之氣化所生。己亥之歲。人多肝病。而有病肺者。子午之歲。人多心病。而有病腎者。此一人之身。自有天地之氣化。調治之法。與五運六氣所至之法同。至於病一也。而所生之病。所受之本。所以至病之由不一者。或以本藏有餘而成。或以本藏不足而成。或經絡所過之處同而成。經之所載。二火所生之病。雖輕重不同。而其實則一。太陽、太陰、水土共胞。寒濕同化。所生之病亦類。目會衆筋。而病變多端。心統五藏。而病生奇怪。清濁異源。各有其機。表裏殊狀。各有其應。今詳舉之。以明治病之訣。

大府泄

肝熱刑脾而泄。卽經言飧泄。餘證當腸鳴。腹支滿。口膠渴。小府赤。宜涼其肝。輕益其胃。診其脈。六脈輕弦。胃上得肝脈。不至大弦。然六脈雖弦。亦不必有骨力。以泄則氣虛不實故也。宜用荊芥散。

荊芥穗 壹分　防風　芎藭　訶子皮

羌活　甘草 各壹分　白蒺梨 半兩　厚朴 十銖 去皮

木香 三銖

右爲細末。非時。以水壹盞。棗壹个。同煎三錢匕。和滓服。

脾濕而泄。經言腹滿溏泄。餘證腹痛。體重食減。甚則足痿。行善挈。脚下痛。宜用削朮豆蔻散。

草豆蔻　削朮　訶子皮 各壹兩　大芎

陳橘皮 各半兩　甘草　膏本 各八銖　獨活

藿香 各壹分

右爲細末。空心。水壹盞。薑兩片。棗兩个。同煎三錢。取八分。和滓服。

腎水之寒。亦生溏泄。以寒濕同化。所生之病一耳。經又言寒迫下焦。傳爲濡泄。陰氣入腎竅。泄無度。洞泄皆屬於水土之所生。其證體重食減。腹痛。四支不舉。甚則注而赤白。腰膝酸痛。股膝不便。若脾氣之濕。則六脈渾濁如革。濡散而大。如按泥漿。加之腎寒。則又沉伏遲弱。動而無力。宜併治其水。暖其脾腎。暖脾藥、宜以削朮豆蔻散。暖腎藏方、萆薢勝金丸。

萆薢　訶子各壹兩　石斛　續斷
芎　附子　巴戟去心　官桂
藁本各半兩　蓬莪茂　山茱萸
當歸　獨活各壹分

右爲末。煉蜜丸如梧桐大。空心米湯下五七十丸。

又方。宜服舶上硫黃丸。方見痢門。

肺金之勝。亦生腹鳴溏泄。肺主清肅之氣。流入于中。變成寒中。鶩溏。又肺主少腹。故生斯病。餘證。少腹痛。中淸。胠脇痛。其脈。六脈毛而微。不浮。毛爲肺脈。微則泄而氣弱。初泄則本肺脈一指偏。一二日則變而微。但不浮耳。尺澤沉而小擊。宜溫其肺。四味芍藥散。

吳白朮　芍藥　桔梗　香白芷

右等分爲末。非時。水壹盞。生薑三片。同煎三錢匕。入棗二个。取八分服。

大府祕

肝心氣實。風血相搏。大府結澁。口苦舌燥。甚則口乾膠。小府赤。頭痛眼昏。六脈洪大而實。宜用柴胡湯。

柴胡　前胡　防風　杏仁去皮尖
羌活　伏苓　甘草　芍藥各一分

麥門冬去心一分　乾地黃八銖　半夏二銖

右爲麄散。食後幷非時水一盞。葱白一根。同煎三四錢匕。取八分。去滓服。

肺氣上實。其氣上蒸。不能傳送。大府祕熱。其脈浮而疾。尺澤脈短。寸口脈大。宜用柴胡湯。加紫苑、麻黃各一分。良。

寒濕之勝。大府反祕。經言陰氣不用。便堅。以土不用事。脾胃不動。無傳送耳。其陰具水土之證。脈亦如之。宜用大腹皮散。

陳橘皮壹兩　青橘皮　大芎　五味子

芍藥　香白芷　甘草各一分　大腹皮

草豆蔻各半兩　木香　檳榔各四銖

右爲細末。每服三錢匕。非時。水一盞。煎八分。和滓服。

元氣虛弱。腎水空虛。胃無津液。大府澁遲。六脈微而虛。宜用蓯蓉粥。

肉蓯蓉一分。米一掬。先洗蓯蓉令淨。切令極細。同米用水兩碗已上。煑作稀粥。既熟。入少許葱。幷薄入鹽醬調和。空心投三四盞。

小府祕

小府之祕。其狀難識。有淋、有癃、有澁。或疼、不疼。肝心之氣。盛實而熱。小腸氣虛。熱氣流入膀胱。遂成小府

赤澁之病。其脈數而輕弦。尺澤弦而長。又微緊。或心脈長。皆主此病。宜用此方。

伏苓半兩　麥門冬去心　芍藥　前胡
杏仁去皮尖　桔梗　防風各一分　荊芥三銖
甘草炙　木通各四銖

右爲細末。食後。以水壹盞。葱白一支。同煎三錢匕。和滓服。

又方。宜服此五苓散。

肝經之熱。小府赤痛。六脈弦急而長。又發寒慄。宜用蔓荊湯方。

蔓荊子　羌活　獨活　麻黃
荊芥穗　芍藥　木通　甘草

右等分。前法煎。食後服。

濕氣寒氣之勝。同犯於心。心氣上行。不得小便。小府不快。宜服削朮草豆蔻散。又服此大芎湯。

大芎壹兩　蓬莪茂半兩　木香四錢　伏苓半兩
甘草　萆薢各壹分

右爲細末。空心。水壹盞。入鹽少許。同煎三錢匕。和滓服。

元氣虛弱。腎氣不足。膀胱氣虛。衝任脈虛。丈夫癲疝。婦人癃閉。宜服此方。其脈。六脈皆動。細數而輕弦。

腎脈小擊而沉。滂胱澁而短。

五味子壹兩　血茸　萆薢　牛膝

芎各半兩　乾熟地黃壹兩　蓬莪茂　青鹽各壹分

右青鹽壹味。自爲細末。餘七味爲細末。蒸餅丸如梧桐子大。空心清湯下五七十丸。

身熱

寒邪所傷。身能發熱。寒氣外固。陽氣內拒。鼻塞氣麤。聞氣出如火。此當發其寒。六脈浮而輕疾。散滿指下。

麻黃去根節　削尤各半兩　藁本　芎

官桂　芎藭　獨活　甘草已上各壹分

細辛四銖

右爲麤散。空心。幷非時。水一盞。生薑一片。煎三錢。去滓服。

心火獨盛。少陰、少陽之勝。身熱。小府赤。大府祕。頭痛。口乾。舌麤。骨疼。六脈洪大而實。有骨力。又數。宜用此方。

伏苓　麥門冬去心　芎藭　麻黃

前胡　柴胡　甘草　羌活

桔梗各壹分　牡丹皮四銖

右如前法爲麄散。

肝氣之熱。身亦發熱。其狀與心火之勝同。以風熱同化。木火相助。其候同也。然肝之發熱。所以不同者。雖熱而往往自聞其寒。多覺背上脊膂洒洒振寒。并兩足多冷。膠涎甚則嘔逆而吐。六脈絃急而長。其他與心火勝之亦同。然心火之勝。脈必洪。而肝熱卽洪大而絃。然亦有上於絃而不洪大者。以風氣之獨勝耳。宜用此方。

荆芥穗　羌活　獨活　芍藥

防風　麻黃去節　連翹子　秦艽

蔓荆子　乾蒌苛　甘草等分

右爲麄散。食後。水一盞。煎三錢。取八分。去滓和滓任意。又看其人氣實。肝藏熱多。至於生涎。則加天南星、半夏、白薑蠶、乾蠍、各少許。天南星、白薑蠶、可與衆藥等。半夏、蠍、隨意加減。不必多。涎結而大府祕。則以牽牛和上件藥服。以疎爲度。

身寒

經言。陰盛生寒。陽盛生熱。元氣虛乏。腎水極寒。發爲寒戰。冷汗自出。六脈微細而沉。寒邪犯心。則腎脈必擊而沉。心下大動不安。甚則仆倒。宜先暖其腎。後保其心。暖腎臟方。

牛膝酒浸一宿　芎各半兩　當歸　石斛　續斷　細辛　巴戟去心　伏苓　五味子　菟蘇鹽水煮　附子炮　菟絲子各一分酒浸兩宿

右爲末煉蜜爲丸如梧子大空心米湯下七十丸

濕氣之勝汗出憎風肌體多冷畏風食減倦怠無力六脈渾濁而緩弱大而散面目無光宜服前暖腎丸并服此方

白朮　陳橘皮　芎各半兩　細辛　藁本　獨活　甘草炙　藿香　官桂各一分　草豆蔻　人參半兩　乾薑四銖

右爲末煉蜜和丸如梧子大空心米湯下五十丸

頭痛

頭痛之狀最爲難辨大風入骨而痛大熱入骨而痛痰伏於胸中而痛元氣虛微而痛心火之勝頭痛六脈之應皆應於心卽用凉心藥風氣之勝而頭痛六脈之應皆屬於肝卽用涼肝藥氣熱而生涎亦能令人頭痛卽用前取涎藥腎水之勝陵犯於心經言心氣上行痛留眉頂間甚則延及胸頭痛腦戶間痛宜暖其腎獨寒濕之氣初作未至犯心寒邪所客多襲於陰上貫風池熱府令人頭目不利腦後兩大筋迸

急。眉目昏眩。此爲寒邪未入五藏。六脈皆初傷寒之屬。浮散而數。宜用前發汗藥。

腹痛

人有病腹痛者。其狀多端。經之所言亦多變。濕邪之勝。腹滿而痛。食減體重。四肢不舉。腹鳴腸泄。宜用此方。神和散。

草豆蔻　肉豆蔻　陳橘皮　白朮各半兩
厚朴去麤皮　丁香　木香　大芎
蓬莪茂各一分　吳茱萸三錢　訶梨勒三錢　芍藥十錢

右爲細末。每服叁錢。空心。水壹盞。棗兩个。同煎八分。和滓服。

寒冷食物所傷。厥入胃。腹中撮痛。卽與前寒濕勝痛之脈不同。若寒濕之氣勝而腹痛。六脈皆微細而沉。時時小擊。經訣所謂陽絃頭痛、陰微腹痛是也。至於爲冷寒之物所傷。則六脈又緊而微。緊應腹有形。此爲物所傷者。脈必有形。而爲濕氣所傷者。脈止於微而已。宜用神和散。加大腹皮半兩主之。覺冷物未化。卽加靑橘皮少許。每服入半夏少許主之。清厥入胃。兩脇下痛。及小腹痛。此肺之清肅之氣所成。六脈當急而微絃。肺脈獨大而實。左尺微小急。蓋清肅之氣流入於中。寒聚而小腹有形。經言。連小腹而作寒。甚則爲婦人癥瘕。丈夫㿉疝之類。肺以毛爲主。若浮、則爲熱。沉大爲冷。至於寒之所聚。則大者歛而爲小急。又甚則緊。緊爲痛。應腹有形。亦各從其類也。宜暖行肺氣以散之。

陳橘皮　蓬莪茂　紫苑　芎
京三稜　當歸　延胡索　官桂
桔梗　甘草炙　木香各一分　大腹皮
芍藥各四銖　白朮半兩

右爲細末。服時水壹盞。生薑二片。同煎三錢匕。取八分。和滓服。

至於肺氣之勝。已傷於肝。則又能體重煩寃。胸痛。引背而痛。宜服前方。又服此暖行肝氣方、人參散。

人參半兩　當歸　桑寄生　白蒺藜
蓬莪朮　芎　獨活　京三稜
甘草各炙一分　藿香四銖　五味子半兩　木香四銖

右爲細末。每服三錢。服時水一盞。棗二个。同煎八分服。

人有病。胃脘當心而痛。食已而痛。又甚。連腹中而急。六脈絃緊而長。宜用肝藥。人有病兩脇下非時氣痛不安。如生積聚。一腹中鼓動。搖悶不安。甚則生氣塊。上衝咽喉。頭目俱迸。口舌膠粘。小便赤黃。衝心而痛。夜臥不安。此爲肝涎與血相聚。致生此疾。其脈當洪大沉實。而有骨力。以肝脈之熱。生風而痛。則脈絃而長。今反洪大沉實者。此爲涎伏之也。宜用荊芥散。

荊芥穗　連翹　羌活　牡丹皮

黃芩　杏仁　當歸　芍藥
山梔子　大黃醋煮　蔓荊子各一分

右每服三錢。食後。水一盞。生薑一片。半夏末少許。同煎取三四沸。和滓服。大府不甚祕。減大黃。若大府祕甚。自作大黃末。每服酌量加減進服。其大黃一味。自修製。臨時末。

素問舉痛論云。寒氣客於脈外。則脈寒。脈寒則縮踡。縮踡則脈絀。急則外行小路。故卒然而痛。得炅則痛止。其脈正與寒濕之氣脈同。宜神和散。

舉痛論云。寒氣客於經脈之中。與炅氣相薄。則脈滿。脈充大而血氣亂。故痛甚。不可按。其脈散滿指下。充大而至數不多。却不甚有骨力。宜去其寒。而行其血氣。

當歸　大芎　蓬莪茂　伏苓
大腹皮　陳橘皮　青橘皮　延胡索
官桂各一分　木香四銖　芍藥十銖

右爲細末。每服三錢。非時。水一盞。煎八分服。

舉痛論云。寒氣客於腸胃之間。膜原之下。血不得散。小絡急引。故痛。按之則血氣散痛。其脈亦差大。差緩而沉。宜用前藥。青橘皮者。

舉痛論云。寒客於夾脊之脈。則按之不能及。故按之無及。夾脊乃膂脈之所行。其脈當尺澤沉而擊。宜行

其腎經。以去其寒。

烏藥 壹分　　芎　　當歸　　京三稜

蓬莪茂　　延胡索 各一分　　木香　　鱉甲 各四銖

甘草 炙三銖

右爲細末。空心水一盞。煎三錢服。

舉痛論云。寒氣客於衝脈。衝脈起於關元。隨腹直上。客寒所犯。則脈不通。脈因之則氣不通。故喘動應手。其脈當實大有形。不勻輕滑而又緊。來疾去遲。如有物制之。宜通其脈。行其氣。

桔梗 半兩　　大腹皮　　芍藥　　木香

當歸　　陳橘皮　　枇杷葉 去毛　　半夏 自爲末。每服入兩豆許。

芫花 好醋於土鍋內煮過。乾炒令煙出。焦黑。已上各壹分。

右爲細末。每服三錢。生薑三片。同煎八分服。以大腑通疏爲度。宜服神和散之餘。如此夕喘。宜調暖其肺。

舉痛論云。寒氣客於背俞之脈。則脈澁。脈澁則血虛。血虛則痛。背俞主於心。故相引而痛。按之則熱至。熱氣至則痛遂止。脈澁。以血虛而不行其脈。六脈細數而肝心尤微。心脈如帶芤。重按卽缺。往往身有汗。宜足其血。以保其心。

人參壹兩　當歸半兩　木香　延胡索
烏藥　官桂　甘草　茯苓
防風各一分　沉香三銖　陳橘皮十銖

闕右語

舉痛論云。寒氣客於厥陰之脈者。絡陰器。繫於肝。寒氣客於脈中。則血泣脈急。引脅與小腹痛矣。其脈皆輕帶弦。肝脈連腎脈。弦長而緊。甚則透過尺澤而弦。宜用此方。

白蒺藜半兩去尖炒　蔓荊子壹分　芍藥　獨活
蓬莪茂　甘草各一分　麻黃十銖去節

右爲細末。每服三錢。空心。水一盞。棗兩箇。同煎八分服。

舉痛論云。寒氣客於小腸膜原之間。絡血之中。血泣不得注於大經。血氣稽留不得行。故卒然成積。其脈沉大而實。膀胱動而有聲。宜通其小腸。

血茸　大芎　蓬莪茂各半兩　萆薢
木香　當歸　茯苓各半兩　青鹽三銖

右爲細末。蜜丸如梧子大。空心。清湯下五七十丸。

舉痛論云。寒氣客於五藏。厥逆上泄。陰氣竭。陽氣未入。故卒然不知人事。氣復反則生矣。其脈伏而大。極無骨力。三部皆芤。身有冷汗。宜灸氣海。後用藥。舉痛論云。寒氣客於腸胃。厥逆上出。故痛而嘔。其脈細而滑。宜用神和散。加茯苓、人參各半兩。

脹滿

人有病。腹脹滿。善噫。兩脇滿。咽鬲不通。此肝勝也。其脈弦而長。宜涼其肝。人有病。腹大。小腹中痛。惡寒發熱如瘧。小腑赤。其脈洪大。此心熱也。宜涼其心。人有病。小腹痛。睡不得小便。頭痛。目似脫。頂似拔。腰似折。此土濕之勝。宜暖其脾。其脈當濁而動。人有病。右肱胠滿。腑腫。心痛。肺膨。腹大滿。膨脹而喘咳。此氣爲火所勝。其脈兩手寸口洪大。肺上亦洪。骨力小如心脈。此爲心肺相持。宜解其金火之熱。以平其心肺。

黃耆半兩　麥門冬去心　茯苓　紫菀
麻黃去節　防風各壹分　羌活　甘草炙四銖
杏仁十四箇去尖

右爲散。非時。水一盞。薑一片。棗一箇。同煎三錢。去滓服。

人有病。身腑腫。腹滿。仰息。泄注赤白。玆血。此少陽之勝。與火勝同候。其脈亦然。以前方主之。

喘

世人論凡喘者、皆以爲肺。然有服肺藥而不愈者。遂以肺不受藥爲難治。何以言之繆也。又或以肺熱而

喘誤投涼藥此又近似之言止可以知肺喘而未足以明五臟之喘且以經言之所言諸痿喘嘔皆屬於上未嘗以喘屬於肺至於言五臟之多寡六氣之勝復則喘之所生可指其狀而明藥之所投亦可以隨其證而效

今人有病胸中煩熱嗌乾右胠滿欬喘唾血肺脹腹大膨膨而喘者此火之刑金肺傷而喘也宜用此方

麥門冬去心半兩　桔梗　麻黃去節　紫菀

杏仁去皮尖　柴胡　前胡　甘草炙

貝母已上各一分去心　羌活三銖　黃耆十銖

右爲麄散每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服人有病左脇痛寒清于中欬而喘此爲肺之清氣所成宜用此藥六脈毛而微腎脈伏而小比之火之盛刑金則異矣蓋火盛刑金而喘則六脈純得火脈疾大而有力若寸口偏大而關脈帶芤卽須唾血

人有病腹大脛腫喘欬寢汗出憎風胸中滿食不消化食減體重六脈沉重而濁渾渾革至如物制之此爲腎寒大過宜暖其腎

續斷　牛膝　細辛　五味子

巴戟　附子　當歸　兎絲子

補骨脂各一分　大芎　萆薢各半兩　木香三銖

右煉蜜丸如梧子大空心鹽米湯五七十丸以神和散並進

人有病肝臟風壅積涎所聚伏隔間口乾而膠食卽惡心全惡肉味心躁不安夜臥不得開咽喉隔塞如物抵築多喘診其脈六脈皆大而沉伏重手取之隱隱然骨間乃得再再尋來疾去遲宜用治涎藥

荊芥穗　天南星　防風　羌活
白薑蠶　連翹　獨活　麻黃
乾荷葉　乾蠟　天麻炮　半夏

右等分修治爲細末每服三錢入半夏末一兩豆許水一盞生薑三片煎七分和滓飯後服

有人得此涎候却緣久病而虛又誤服熱藥或元氣本虛六脈大而無骨力却浮洪而數重手按之則浮指而虛有表無裏却不宜用前方此病難治當用此方

人參半兩　天南星炮　防風　獨活
麻黃　天麻炮　琵琶葉去毛　半夏
羌活已上各一分　白薑蠶玄口　薏苡仁各十銖

右除半夏一味自爲末餘爲細末非時水一盞薑三片煎至七分又宜時時以補藥助其元氣而徐以此壞涎藥撓之

人有病久患欬嗽虛羸氣乏胸中氣微不能報息六脈虛微而數此之一候並帶勞疾證卽爲難治若脈

止虛微不浮而數寸尺調勻。卽藥到便安。若浮數而虛。亦勞也。若浮大疾數而虛。輕手取之。全無骨力。重手按之。全不應指。此不治之證。肺萎、當用此方。

人參 半兩　五味子　茯苓 各半兩　鱉甲 酥炙

山藥　麥門冬 去心　甘草　枇杷葉 去毛。各一分。

黃耆　紫菀 各十銖　半夏　阿膠 炙透。各四銖。

右爲麄散。生薑三片。每服入半夏一兩豆許。飯前服。或非時服之。又宜服補腎氣藥。以歸其元氣。每服三錢。水一盞。煎至七分。

脚痛

脚氣之病。蓋由有寒濕之勝。故經於太陰之勝。言足脛腑腫。於太陽之勝。言至引陰股。筋肉拘苛。又言。歲土太過。甚則肌肉萎。足痿不收。行善瘈。脚下痛。飲發中滿。四支不舉。此寒濕之氣所成也。然天下之病。固有似是而非。本異而標同。用藥過差。則利害相反。若脚氣之病。本於寒濕之勝。而至於肺熱。而病生於足。胃熱而風生於足。與脚氣相似。而寒熱殊狀。試別而明之。熱而足痛者。以肺經之所行也。故經言。歲金太過。則股髀踹跗足皆病焉。胃熱而足病者。抑以宗筋不行。而傳爲痿厥也。

今有人病足痛。得水土寒濕之狀。六脈沉伏而動。上濁下虛。尺澤微而澁。宜暖其下。用此方。

牛膝 半兩　黃耆 半兩　獨活　當歸

石斛　附子　萆薢　五加皮各一分

天麻炮　大芎　續斷各十銖　細辛

木香各三銖　官桂四銖　芍藥壹分

右爲末。薏苡粉煮作稀糊。丸如梧子大。空心服五七十丸。温酒或鹽湯下。

肺乘熱而足病。則左手一手脈全微而細。左尺又小。搏擊而沉。右手脈偏有骨力。洪大而肺脈尤甚。再尋。虛弦而長。用修崔氏紫蘇方服之。蓋世人多以崔氏方治脚氣而得效。不知此方止可治肺熱脚痛耳。

紫蘇子　芍藥　官桂　茵芋

茯苓　大腹皮　桔梗　甘草炙各一分

羌活三銖　麻黃去節一兩　黃耆半兩

右爲麄散。生薑一片。煎三錢。以爲飲服。

胃熱而宗筋不潤。則脚弱無力。兩足酸軟。或帶微腫。診其脈。胃脈一指絃而長。又微帶疾。六脈差大。宜用此方。

大腹皮半兩　茵芋八銖　杏仁去尖　伏苓

芍藥　當歸　陳橘皮　甘草炙

薏苡仁各一分　青橘皮四銖　芎十銖

右爲麄散。非時薑煎。仍以前暖腎藥、壯元氣藥、相兼而進。若服此藥。大府微利。卽住此。却進補藥兩三日。待定帖。仍進此藥。

脈要精微解

經曰。春日浮。如魚之游在波。夏日在膚。泛泛乎萬物有餘。秋日下膚。蟄蟲將去。冬日在骨。蟄蟲周密。君子居室。故曰。知內者按而紀之。知外者終而始之。此六者。持脈之大法。以經意考之。以四時之脈。分表裏之淺深而決之。以內外之辨。且以春日浮如魚之游在波。則陽氣之萌。脈雖見而未出於膚。夏日在膚。泛泛乎萬物有餘。則脈已在膚矣。秋日下膚。蟄蟲將去。則秋陰氣之至。脈雖下膚。而未至於沉。冬日在骨。蟄蟲周密。則脈已沉矣。以是知內者按而紀之。以明脈之在裏也。如秋日之下膚。冬日之在骨是也。知外者終而始之。以明脈之在表也。如春日之浮。夏日之泛是也。然知內者必曰按而紀之者。蓋脈之在內。非深按之。無以得其實。知外必曰終而始之。則初按而病已見矣。故因其病。以推原其本。啟玄子乃以知內爲知脈。知外爲知色。殊非黃帝所謂持脈之大法也。細舉而明之。心脈搏堅而長。當病舌卷不能言。凡脈之搏。以有所犯。而鬼勝則搏。心脈之搏。以腎邪犯之也。病舌卷而不能言。舌雖應心。而舌本蓋少陰經之所散也。治之之法。不獨涼其心。且暖行其腎。其大而散。當消環自己。若心脈之芤。雖芤而軟。縱失血。亦當溫。加之以胃藥。

紫蘇子　黃耆　芍藥　官桂

獨活　茯苓　大腹皮　甘草炙各一分

天麻炮十銖　杏仁四銖去皮尖

右爲麄末。薑煎。不計時候。用水一盞。煎七分。

寸口脈沉而弱。曰寒熱及疝瘕及少腹痛。又曰。脈急者疝瘕少腹痛。病同而脈異。啟玄子遂以爲經傳之誤。亦不知變矣。寒疝之爲病。有寒清連於小腹而爲疝。故止言寸口脈沉而弱。不分左右之脈皆沉故也。右沉則肺冷。而寒清之氣流入於中。左沉則心氣不足。血爲寒邪所犯而少腹痛。至脈急曰疝少腹痛。則言六脈之皆急也。蓋經嘗言。診得心脈而急爲疝。正謂此矣。寸脈弱而疝者。宜溫其中。脈急而疝者。宜緩其中。

寸脈沉而疝者。宜用此方。

當歸　牛膝各半兩　烏藥　木香

京三稜　蓬莪茂　延胡索　茴香

官桂　萆薢各一分　芍藥　大芎各十銖

沉香四銖　血茸　細辛各五銖　益智子三銖

右爲細末。蜜丸如梧子大。空心。清湯六七十丸。

脈急而疝。宜用此方。

蔓荊子　麻黃　芎　蓬莪茂
甘草炙　木香　茯苓各一分　芍藥半兩
獨活十銖

右爲細末。每服三錢。生薑三片。水一盞。煎至七分。不計時候服。

明熹脈

春戌、夏丑、秋辰、冬未。四時之喜神。取五行之養氣爲用。皆歷三辰而數。如春以戌爲喜神。卽正月在戌。二月在亥。三月在子。四時放此而推。若於脈中得之。犯他脈。喜有喜慶之事。四時脈皆於胃中見。以五行皆資土以致用。而周身之脈。亦因胃脈。然後見於氣口。如春脈以弦爲主。須六部脈皆循循。不急不絕。不緊不數。而胃脈微弦而緩。弦爲春。緩爲本。六脈無犯。主一月內喜應。若正月於戌日見。二月於亥日見。三月於子日見。則旬內應。如胃脈帶弦而毛。則主災。夏脈洪爲主。六脈皆隱隱而大。不散不浮。不滑不數。胃脈微洪而緩。洪爲夏。緩爲本。脈六脈無犯。一月內喜應。旬內得脈。皆不出旬。秋脈主毛。胃脈上輕。帶毛而緩。又須有根蔕。此一脈難辨。如四時之脈。蓋若毛而輕。如風如氣。則反爲災。不爲喜脈。惟不浮不輕。緩緩而徐。浮手按之。乍如秋脈。重手取之。則去來如一。壓之不散。舉之不輕。然後爲喜脈。日辰之應。與春夏同法。冬脈最爲易辨。但胃脈沉而不擊。卽是。

病有懸性命於毫髮之端。決死生於頃刻之下。死生之間。係醫者之工拙。醫者之工。則病之痊愈速如轉圜。醫者之拙。則所投之藥過於白刃。此傷寒之病。非獨傷人之急。醫者之難事也。古人有言。一日二日在於皮膚。四日五日傳之藏府。故皮膚之間可汗。傳藏府之間可下。世之學者。未嘗不宗之以爲定論。然不知人之有虛實。則病之有輕重。病之有輕重。則傳之有遲速。忽有經兩日三日。而尙在皮膚。忽有初經兩日三日。而傳藏府。善爲醫者。當審察其脈。審其病之所在而已。嘗以治傷寒之病有四失。一、失之愚。蓋傷寒之病。其始在於皮膚。其次傳之藏府。當皮膚之間可汗。於藏府之間可下。苟不辨陰陽。不分內外。當汗而下。當下而汗。誤投藥餌。以傾人性命。此一失之愚也。二、失之不精。蓋傷寒之病。傳之藏府。則證候多端。千變萬化。莫能盡究。其毒氣之在肝者。不可疎脾。在心者。不可疎肺。五藏之治。餘皆同此。醫者治之。決以爲病之所傳。在於何藏。方之所投。當以何藥。病之所減。當以何時。藥之一投。遂可平復。苟不知病之源流。不識病之傳受。誤投藥餌。以希苟合。不幸而少有差誤。人之傾危。可立而待。此貳失不精也。三、失之怯。蓋傷寒熱毒。傳在五藏。攻損正氣。其毒氣之盛。如煙如霧。薰炙三焦。致令病危困。不思飲食。醫者反以爲胃氣之虛。不肯通疎。遂見傾損性命。但今患傷寒熱毒之人。飲食不進。大府不通。小便黃赤。病者危困。卽先定其病之所傳。在於何藏。急以疎轉之藥。取其毒氣。其病勢輕減。則飲食增加。而平復如故矣。此三失之怯也。四、失之暴。蓋治傷寒之法。既失之愚。又失之怯。則不精不詳者。不可容易言也。愚因言治傷寒之怯。切慮後之學者心術未明。見識未到。但務以不怯爲志。妄投轉藥以傷人性命。此余所以言四失之暴也。

後之學者。苟能明此四失。亦足以識治傷寒之大略。至於陽毒所次。陰毒所注。其傳在五藏。則藏證各殊。貫於六府。則府證各異。其傷人之急者。惟二感尤爲極重。余今輒以病證脈候陳其一二。庶幾世人緣此之傳也。

一日。巨陽受之。巨陽之脈。起於目內眥。上額交顛。上入絡腦。下項。循髆內。夾背。抵腰中。在手爲小腸。在足爲膀胱。故頭項腰背強。其脈當疾數而浮。以散。如新沐浴。如風。而左尺脈微緊而數。

二日。陽明受之。陽明主肉。其脈夾鼻絡於目。故身熱目疼而鼻乾。不得臥。其脈又經於腹背。上頭項。在手爲大腸。在足爲胃。診其脈。當疾數而浮。漸漸按之。如通於裏。以陽明爲宗筋。而胃脈受之。又漸入於裏。六脈雖浮數。而胃脈一指微洪而數。

三日。少陽受之。問其脈。循脇絡於耳。故胸脇痛而耳聾。又起於目銳眥。上抵頭角。下耳後。其脈當疾數而利。得六七至以上。而肝脈又差數。此三陽受病。皆屬於表。故其脈疾數而浮。以其未入於藏府。故言汗而已。

四日。太陰受之。太陰脈布胃中。絡於嗌。入胃。上隔。夾咽。連舌本而散於舌下。其脈當疾數而洪大。有骨力。胃脈差大。

五日。少陰受之。其脈直行者。從腎上肝鬲。入肺中。循喉嚨。夾舌本。故口燥舌乾而渴。其脈最爲洪大。六七至以上。心脈隱隱應指。來去如一。

六日。厥陰受之。厥陰之脈。自足上循陰器。抵少腹。又上貫鬲。故煩滿而囊縮。其脈疾數如長。三陰三陽。五藏六府。榮衞不行。五藏不通。則死。大抵三日以前爲三陽受病。其脈在表。宜汗。三日已後三陰受病。其脈在裏。宜泄。若初經三日。其脈疾數大。表裏如一。卽不可汗。亦不可下。只以解利藥通其中而已。

一二日。脈氣疾數。以溫辛發散藥汗之而愈。藥中亦須有通表解藥。不可純用熱藥。既汗之後。脈當安和。緜軟。不疾不數。如老年衰削人脈。輕手按之。緜緜不絕。重手按之。隱隱不乏。卽自然安寧。若既汗之後。疾數不解。卽難治。加之以結。則困重。或至於死。蓋結脈疾數而懸絕。纍纍如珠。而又不流利。與滑不同。但逐部位通流於指。如滴水起頭是也。然初得病。一日二日內。有增寒壯熱。脈輕而浮。乃謂之傷寒。若纔得病。並無增寒。頭疼欲碎。身熱如火。頭目赫赤。眼睛迸火。大府祕。小府赤。六脈洪大有骨力。此名熱病。雖初得。亦不汗。蓋治傷寒之法。惟初一二日。與熱病使藥不同。

三四日已後。與熱病同醫。一日二日。脈氣微小。不疾不數。不浮不散。唯沉軟而細。則汗之之藥。宜極以溫辛。如脾胃濡沉。則是感冷之一候。多變成陰證。陽毒傷寒。面赤頭痛。身熱如火。心神煩躁。頭目昏眩。項背強直。脈候當洪大而有骨力。

傷寒煩躁。飲水不休。若脈實而洪。不是疾數。是爲涎毒。若洪大而不實。是爲心脾受毒。

傷寒後。寒熱已退。腹中餘一塊。疼痛不可忍。忽走在腿面上。疼。此爲遺氣在肝。脈氣洪而長。肝脈循循而過左足。宜清其血。

四五日。熱毒上衝。心胸噎塞滿悶。渾身壯熱。頭痛不止。大府不通。胸中痰實。脈氣當寸關脈實。而尺澤輕如絕。心脈炎炎而上。

熱毒在肝。善怒。筋脈碎痛。神昏。不欲見人。兩脇脹滿。手足躁。不安臥。右手關脈。當偏大緊急而長。熱毒在心。頭疼煩躁。面赤。舌強。口語不快。忽心痛。善嘔。狂言妄語。忽思狂走入水。精神不守。左手脈。一指偏大。若舌強硬急。以妙手針刺其舌兩傍出惡血。不可刺其舌心。熱毒在脾。渾身肌肉碎疼。閒食卽惡。思吐。通身發熱。兩唇乾焦。邊脈動。或環唇青黑色。甚則腰痛腹滿。兩頰痛。右手關上脾脈。一指偏大如衆脈。

熱毒在肺。上衝咽喉。心胸壅實。隔塞不通。渾身大熱。面色或赤。而又帶白。喘欬不得大息。右手寸口。一指偏大。而加之以浮。

熱毒在腎。腰背疼痛。脊膂強急。頭不痛。若渴數飲。甚則項痛而強。脚寒以酸。足下不欲言。其脈當左手尺澤微而輕浮。又輕緊。

傷寒。熱毒攻於肝心兩藏。毒氣煩盛。上衝於肺。血隨氣逆。鼻中衄血。口中吐血。甚則耳中眼中皆有血。診其脈。當洪大而炎上。如流水之長。如乍開乍合。乍歛乍散。此爲失血之候。熱毒內傷肝心兩藏。肝心失守。不能主血。毒氣煩盛。上蒸於肺。血隨氣行。流入於肌膚。發爲赤班。通身大熱。頭重疼痛。睡時如己身傍畔更有一身。精神昏亂不守。其脈雖大。而鬱結不解。重手取。隱隱而有骨力。如重夾綾絹裹之。爲發班之候。

傷寒。熱病發嗽。坐臥喘急不安。其脈。右手寸關脈當洪大。而加之浮數。傷寒。熱毒熾盛。薰炙三焦。攻擊皮

膚。通身發如橘色。其脈如發班候而差沉。與黃疸同法。

熱病結胸。心前閉塞。胸中有一塊不通。堅硬不散。通身發熱。頭疼不安。面色黯赤。喉中涎溢。大府祕熱。昏悶不省人事。病則伏暑相似。其肺當洪大而有骨力。而肺脈實而不浮。伏暑卽結而沉。

傷寒熱病。五六日。愈加困重。因喫疎藥。下糞如紫黑色。病勢不減。神思昏昏。小腹膨脹。狂言妄語。不省人事。甚則腹中有塊。堅硬不散。其脈結伏。此毒氣攻血。腹內有淤積惡物。十嘗九死。

陰毒傷寒。渾身手足厥冷。面青。唇皮無色。四肢無力。心中寒慄。重則閉目。不知人事。脈氣當細微而沉。重手取之。又軟而無骨力。若腎脈細微而搏沉者。爲重。

診失血

脈訣謂芤爲失血。芤脈狀如按環子。內面兩頭有。中間曲而缺。非謂絕也。若心脈肝脈帶芤。而肺脈浮以數。又肺脈微弦而緊。則骨蒸咯血。

心脈芤而肺脈軟沉。尺脈沉伏。微微帶緊。腸風下血。

心肺芤而尺脈緊。膀胱滑。小腸溺血。

肝脈芤而肺脈大浮而促。兩手尺澤皆微喘而咯血。

肝心肺脈俱盛洪大而不甚有骨力。乍開乍合。如流水之狀。此金火相傳。當吐血。心脈微而緊。促而朝上魚際。急按卽來遲去速。此爲腸風。下血少。多心戰。憚事無心力。肝脈長而動。下貫尺澤。心脈大而實。三焦

血有餘亦當下血。

肝脈細微而澁尺澤微。胃脈濡大府失血。

心脈與肝脈不盡連接如滴水起頭鼻衄出血。肺脈浮大而散。心脈大鼻暴衄。

訣云。緊爲蟲、爲痔。須肝脈亦緊幷細。方爲痔。不爾卽蟲也。

六脈浮大無骨力來疾去遲輕手帶洪重手取之如濡此久害瘡癤血少六脈浮大有骨力肝脈弦而長。

肺脈大而實沉與胃相際胃脈輕弦而濡此三焦血泛胃虛下血。

六脈如常心脈動腎脈搏而沉又細而數血泄或溺血便血。

婦人胎孕在手關寸脈滑數而肺脈虛而毛尺澤陷而與關脈不際者孕也若肝脈長而溢寸胎漏失血。胎下血有二有肝氣虛微腎脈緜軟胎脈陷下胎動而失血者當補之若肝脈有餘而失血是胎溢當涼也。

婦人肝脈洪大而反結澁。訣云。澁脈生婦人敗血若脈洪大而又伏則積塊而血不行久則陰門腫以厥陰脈絡門而過。

診失精

腎脈虛緜軟而沉又微以濡凡尺脈得八裏脈又搏擊皆失精心脈動多夢交六脈濡緩而輕浮又澁多溺精。

六脈濡。腎脈沉而細。膀胱脈動而緩以大。心脈動而浮。主小便白濁。肝心脈弦而腎脈緊而細。重手按之。却來遲去疾。小府當赤而濁。腎脈細沉而微緊。肺脈重而洪大。小便卽少腹先痛。此寒伏於胞絡中。

赤脈弦而結。陽中有伏陰。胞滿。小便不出。小腹迸脹。

六脈如常人。獨脾脈一指疾大而數。唯腎脈差微。主頭疼。口乾。溺精。此爲土邪入腎。當淸其脾。

婦人尺澤帶弱。遲。八裏之脈。膀胱脈動。多下白帶。若腎脈搏而沉。陰中濕癢生瘡。丈夫陰濕。此皆精氣之失。

六脈皆澁。又遲緩。丈夫失精。婦人敗血。

心脈肺脈疾而動。腎脈膀胱動而濡。丈夫溺多口乾。若婦人產。乳多口乾。卽多補其腎。不可以口乾爲熱。

診癲疝

癲疝之病。尺脈緊而動。按之卽虛。

肺脈輕弦而虛。胃脈沉濡而軟。尺脈緜軟。寒厥入胃肺。主少腹。少腹當如有形。腎虛卽成癲疝疾。

肝脈弦而疾。腎脈緜軟而虛。亦爲以厥陰祇陰器絡陰而過。乃爲癲疝。

六脈急沉。爲疝爲瘕。爲少腹痛。蓋疝瘕皆寒搏於中。而急則爲痛。腎脈大急沉。爲腎之疝。當暖其腎。肝脈大急沉。爲肝之疝。當暖其肝。心脈搏而沉。又急而沉。肺脈同診。皆爲疝。若小急而不鼓。皆爲瘕。

診汗脈

脈訣曰。陰微盜汗。勞兼有此。特其一端耳。大抵汗爲血之餘。若陰微。則血不足。則當主少汗。此言微盜汗。當緜軟而澁。右手㑊胱急而沉。心脈搏而動。方主盜汗。小府澁。忽失精。

六脈皆滑。主汗。以其陰氣有餘。故多汗。

心脈大滑而腎脈搏沉。以汗爲心之液。今心脈大滑。則水犯之而動。故汗。

心脈獨大而洪。六脈疾而動。主睡中忽然出汗。以心氣獨主故耳。

六脈濡濕而重濁。脾脈大而濕。主汗出惛風。

論膈噎

六脈微而澁。腎脈綿軟而沉。來遲去疾。如代脈相似。心脈沉。主元陽正氣虛弱。陽事不起。小便餘瀝。輕冒風雨。忽喫些子冷物。卽胸中噎塞。如有一塊物在喉中。飲食無味。

肝心脈澁而遲。來遲去速。肝脈無骨力。主思慮喜怒。忽憂淤思憶。其狀。心胸滿悶。隔塞不快。飲食難下。兩脇脹滿。忽時氣痛衝心不可忍。面色青黃。肝心脈澁而沉。重手取之。緩而無力。如新沐舉重。來遲去疾。胸中噎塞。飲食減少。行步無力。大府虛冷。非時間心前如有一條冷線。上徹咽喉。此爲冷噎。六脈澁而浮汗。肝心脈浮大而無力。胃脈大而散。重手取之。雖無骨力。隱隱而來。唯兩手尺澤差短。其胸前隔塞。飲食減少。大府祕熱。忽時不調。喫醎卽心躁。喫暖卽喉乾。痰實。頭目昏暈。兩足無力。載身不起。舌上生瘡。脣皮焦裂。或非時口中涎流。衝肺散爲乾嗽。忽時急飢。見食卽吐。食不住腹。此熱膈。

六脈微有骨力而來遲。却差小而微急。主寒熱氣膈。其狀大府熱。忽時却下黃糞汁。胸中鬲塞不快滯氣積聚。

六脈浮大輕。有骨力。來遲去速。肺脈偏大而浮。加之泛。如促聚於寸口。主熱噎。胸前噎塞不通。飲食不下。所喫湯水只到喉。仍便吐出。所咽下津液。只到喉中。亦便吐出口膠。非時睡涎溢。大府祕熱。當用通藥。利其大府熱咽。如上所說。用引大府藥。既通其大府。卽脈氣洪大如實。但去疾。與尋常洪大之脈不同。卽輕以解肺順氣益胃化涎藥餌之。

六脈皆得噎。脈肝脈偏大而澁。肺脈橫格。主因怒而得。大便不通。

六脈皆噎。脈肝心微小而弦。微有骨力而來遲。因悲憂而得。所喫物。閒巡歷胸間。隱隱而下。蓋風不化。血不盛。當益其肝心。順其氣。

六脈濡伏。重手取之。如動而無骨力。主冷噎。飲食不進。身上厥冷。胸中如有冷物塡塞。

六脈濡伏。胃脈偏重。濁而重。主胃寒。履濕而得噎。四支厥冷。胸前噎塞。飲食不下。

診室女婦人諸脈

諸婦人之脈。陰陽與男子相反。當要尺澤隱隱。來去如一。和緩。不澁不弦。寸口平。方能孕育。若尺澤弦急。肝脈動。心脈疾。六脈澁而不與勻。無子。

血盛氣衰。爲孕。謂心脈洪大流利。替替而滑。肺脈毛而微。却不浮。爲孕。仍須尺澤與肝脈微間。而肝脈微

橫。卽是孕。

肝脈澁而不絕。尺脈微陷。心脈滑。是孕。

肝脈澁。心脈滑。肺脈襄一。如孕脈。然尺脈急而長。爲敗血。爲積血。非孕。

肺脈急而弦長。右脈浮而短。小腹堅硬如孕。

肺脈急而沉。腎脈濡沉。小腹有形如孕。

肝脈急而沉。腎脈小急緊。陰痒。陰中痛腫。

室女六脈皆弦而長。又洪。尺脈微緊。經候通行。兩足痛腫。行不得。肌肉消瘦。大府乾澁。頭痛眼昏。室女十六七。肝脈弦而長。胃脈輕弦。表裏如一。骨槽蒸熱。風行周身。上焦壅。肌肉消瘦。忽通身黃黑。面色帶黑。小便黃赤。五心煩躁。漸欲成勞。

婦人肺脈盛。肝脈軟而虛。忽微而動。心脈芤。肺氣有餘。相刑尅。肝木受金傷。不能主血。月候多少。遲速不定。多不節。以致無子。偶然懷之。又無故墜下。當減其肺。益其肝。

關尺微細而沉。腎氣虧乏。不能生肝。經候多少遲速不定。不能生子。

肝心脈弦緊而疾。肺脈浮而大。尺澤鬱鬱不散。月經不通。大府祕熱。兩足痛。不得行。肌肉消瘦。漸次如馬籃節。

六脈弦緊而長。心脈洪大而實。尺脈結。月經不通。長淤。怒不得安處。忽忽似顛狂。夜不得睡。小便赤。大府

如常。忽下鴨溏。

肝脈虛弦而長。按之無骨力。心脈動而疾。肝邪傳心。日夜煩躁。忽如顛狂。不得眠睡。六脈大而沉。肝脈橫。肺脈浮。主婦人血熱。經候行少。背上非時有一片發熱。口無津液。忽兩三月一次。忽半年不行。或止些小黑血。

六脈大而沉。重手取之。隱隱乃得。輕手如無。重取却有骨力。非如尋常沉伏之脈。此因胎藏本熱。忽因產後未經百日。恣喫涼物。寒熱相伏。經及二三年月候不通。全如懷孕。惡血所聚。如有身露下有塊。但堅硬不動。往往却氣。氣痛。只以辛溫藥散。自然行下。不必疎通。

婦人脈如孕。尺脈亦絕。與孕無殊。但六脈動而不勻。胃脈輕帶伏。此因經候行次。或產後起早。幷誤喫生冷。傷損。氣血俱病。因生積聚。久無所療。變成惡物。其狀。腹中成塊。如虵鼠。如鹿如虎之類。以手按之。衝手跳起。但此病到年深。其惡物帶命喫人血盡。忽絕無經候通行。或經候行時只如淡水。如此。卽傾危人也。

六脈疾大虛急。有大爲風。浮血溢。急爲尺澤有寒。忽因經候行時。忽因產後喫生冷不相當之物。忽產後早起。傷風。血氣俱病。臨經行時。忽先氣疼。忽小腹急疼。

心脈芤。肝脈虛。尺澤微細。血海虛損。經候過多。忽成片流下。不可禁止。六脈皆沉。肝脈弱而虛。尺澤細細如縷。又帶澁而遲。肝腎多感寒。伏在子宮。血海虛損。經候過多。小便白濁如米泔。少陰腎脈貫脊而行背上。忽有片寒冷。口中卽吐清水。

六脈疾大而浮。腎脈急而浮。心脈差洪。血風頭痛。口乾吐痰。

六脈弦大。肝心脈澁而短。尺脈急沉而搏。緣使性多瘀怒。傷損肝心正氣。因而積涎。怒而氣逆。涎隨氣上。其狀。聞得心前昏悶。潰亂不快。遂有一塊之物。上觸到咽喉。卽手足俱冷。口禁不開。不省人事。

六脈弦大而疾。尺脈亦弦而動。泛泛不絕。經候過多。七八月不止。皆下鮮血。此非虛。不可補。止可涼風血。緣風盛血散。然久而不止。卽肝氣脫血。

妊娠之脈。若肺雖微。然浮而聚於寸口。當上氣喘促。

妊娠。六脈雖要滑而流利。然肝脈滑而洪大。胃脈亦有骨力。則上喘而口膠。見食多。

妊娠之脈。尺脈不絕。與肝脈相連。而口軟無力。又沉以細。當主少腹疼痛。蓋胎氣熱則在上。冷則墜下。

妊娠之脈。尺脈急沉而搏。胃脈濡而重。六脈又軟。胎氣墜下。陰門腫。

妊娠。六脈疾而動。肝脈如長而散。主胎漏失血。不可補之。此血溢也。當安其胎。涼其血。

妊娠。尺澤沉伏。肺脈實沉而動。腰痛不可舉。兩手沉重。行步無力。睡。腸痛。

妊娠。心脈洪大而浮。肺脈浮而散。胃脈浮而大。通身瘙癢。漸次面目渾身俱腫。心躁不安。

妊娠。六脈皆結而伏。胃脈沉而動。主忽然如中風。心前昏悶。卽如有一塊物塡塞。此緣臟腑本熱而忽感寒。忽喫生冷。寒熱相伏而不散。以辛溫散之。

妊娠。六脈洪大。過關溢寸。主上鬲有熱。唇口乾焦。口舌生瘡。非時頭痛不安。小便黃赤。

姙娠。血有餘。六脈大而疾。又緊而流利。表裏俱有骨力。主渾身碎痛。并腹內疼不可忍者。宜涼其血。

婦人姙娠。有發熱如瘧。雖夏常畏風。此肝盛血熱。風行于表。熱極卽生寒。若肝盛胃虛。卽更右一壁寒。以姙則血盛而氣衰故也。診其脈。當左長而緊。微帶浮。右關沉而濡。如按泥漿。

婦人之脈。六脈俱沉細而急。左手尺澤微而緊。指指如縷而轉。連及肝脈。按之卽結而散。此胞精不足。當久患敗血。赤白帶。若動而數。加之以短。卽不久傾危。

婦人之脈。皆沉而洪大。重手取之。其深至骨。隱隱然應指。有骨力。來疾去遲。至數與常人無異。但胃脈亦洪大。上隔有伏涎。此爲血澁生積。當經候不快。忽不行。腰痺。口乾而渴。背迸。眼睛迸。兩臂重。手缺盆迸。大府秘。心憎。夜不得眠。

診黃疸

黃疸有二。有肝熱刑脾而疸。有濕極而疸。若肝脈洪大。胃脈濡弱而濁。肝脈加之浮。腎脈搏而擊。卽發黃疸。若胃脈重濁而弦長。按之無骨力。腎脈搏而沉。心脈有動象。卽濕極而發疸。然疸之病。多先目黃。以衆脈皆會於目糸。所以肝熱亦目黃而疸。胃熱亦目黃而疸。肝熱卽口乾引飲。小府赤而澁。胃濕亦目黃而口不乾。小府赤而不澁。又有下部冒寒履濕。濕氣衝心。發爲目黃。不必是疸。素問言太陽之勝。有面赤目黃者是也。只可緩行其小府。濕熱相鬱而疸。卽口脈洪而大。不弦。却帶軟而長。宜利其小府。

半產正產論

夫半產、正產。婦人之常事也。然其間多有產後染成大病。忽絕無月水行。忽宮藏虧損不禁。忽積成癥瘕。而歲久月深。傾損性命。此無他。輕之以爲半產。而不甚將養之所致也。不知半產之候。其將養當過如正產十倍。正產止血藏空虛。半產卽肌骨腐爛。常切譬之。正產有如果中之栗。夫栗之爲物。俟其自熟。陰陽氣足。則其殼自開。而栗子自墮。方是之時。子之與殼。兩無所損。如婦人懷孕。十月已滿。陰陽氣足。則其子宮自開。而兒子生下。若月未滿足。因誤服藥餌。忽寒邪熱毒所傷。忽扶輕舉重。忽倒地打傷。其胎藏傷損。胞糸腐爛。然後其胎墜下。卽有如世人採折新栗。碎其皮殼。就殼中斷其根蔕。然後取得栗子。此其半產之喩也。以其胎藏傷損。胞繫斷去。而後胎墜下。則其半產之人。將養調治。得不過如正產十倍者哉。正產之後。補其虛。生其好血。化其惡血。保其藏氣。去其風邪。人人無有不安也。半產之後。補其虛。生其肌肉。益血。窮其所因。解其病。去其風邪。養其藏氣。加之將養。過如正產十倍。損傷之胎。無不平復也。吁。世之人多輕之。至於傾危。不可勝數。得不惜哉。

正產、半產出血過多。不可禁止。忽氣悶不識人。其脈洪大而浮以泛。如新沐。如破肚之脈。若微細而澁絕。其候凶。

胎死腹中。其脈洪大而沉。尺澤當溢透下部。不澁不絕。卽無畏。謂胎不下。當氣滿實。所以洪大而沉。又溢寸過。若澁而短。卽死。

婦人欲產。漿破血下。渾身疼。診其脈。當洪大而有骨力。尺澤透而長。方是正產。謂孕則尺脈不來。欲產而

漿下。則尺澤透。若渾身疼甚。而漿未破。血不肯下。卽難產。凡渾身痛甚。須是腰痛。連穀道疼迸痛。方是正候。以少陰犯胞絡脈。連腰過脊及肛門。若只是腹痛。不可用作正產候。

產後。脈結而澁。尺脈短而動。肺脈浮而急。卽是衣未下。產後血風虛熱搏之。洪大而數。數與疾不同。數則兼動與短。主血暈。面色深赤。身體如醉。見屋宇如懸倒。忽頭痛重不安。

產後血風虛熱搏之。洪大而疾。心脈實而有骨力。肺脈洪而浮。主血逆頭痛。面赤如醉。身體如在虛空。大腑祕澁。語聲微細。

產後。六脈得洪大。如血暈脈。胃脈實而弦。肺脈浮而洪。主大腑祕熱。頭痛面赤。惡心嘔逆。產後。如骨蒸脈。六脈弦而微緊。有骨力。主血行少。未經數日。身下乾淨。腹中餘血惡血未下。非時氣痛。攻心刺肋。

產後。六脈輕浮。微有骨力而來遲。肝脈細而虛弦。多因小遺登後早。忽亂喫食物早。宮藏傷風。飲食減可。近以十日。遠經半月。粥食不進。才喫一口湯水。卽聞湯水巡歷胸中。方下入胃。既入胃。仍下出。面色幷肉色黃。形體困重。此候留風邪在中。血熱而感寒。成寒熱隔氣。風不用事。食不化。此病須是喫得酒一兩盞。方可調理。每日宜服酒一兩盞。如治風咽調理。故予特製此方。

細辛　官桂　芎　當歸各半兩

羌活　藿香各一分　木香壹錢　桑寄生□分

吳茱萸　蓬莪茂各三錢　甘草四錢炙

右爲細末。每服三錢。空心。煎防風湯調下。喫了。渾身手足暖。忽頭疼。卽連喫酒一兩盞。候通身發熱。忽行下惡物。卽便安樂也。若人得此病。須是依上件題目。方可服此方。

產後。六脈皆沉伏而遲。主渾身厥冷。非時□不識人。

產後。六脈動而疾。胃脈滑而溢於尺澤。腎脈軟而虛弦。此緣產遲。忽衣遲。旣產後。早起傷風。吐泄不定之脈。宜溫其胃。

產後。六脈沉細而伏。此寒氣在下。腰痛。起動不得。

產後。六脈沉細。腎脈伏而沉。肺脈虛而大。產後乳汁多。故流出。其乳汁冷而口乾。此腎冷肺虛寒。不可以口乾爲上熱。誤服涼藥。此腎少陰之脈。從肺出。絡心注胸中。其直行者。從腎上貫肝鬲。入肺中。循喉嚨。夾舌本。故如此。

產後。六脈洪大而結。肝脈澁。肺脈浮。忽然乳疼。堅硬成塊。將欲成癰腫。

產後。未經百日。腹疼氣疼。轉瀉不止。六脈沉細而虛。此餘寒在中。

產後。心脈一指偏小而動。又芤陷。若肺脈重而洪大。却無骨力。則主乳多。肺脈如常。惟心脈如此。加之腎脈微細。則小便虛憊。

產後。惡血行。少腹中塊刺痛。須六脈大而緊。肺脈緊而虛弦爲寒肺。主少腹中有塊。產後血熱。肝藏風搏生涎。發爲疼痛。卽急心痛。六脈當得二陽一陰。二陽實大。一陰者沉也。

產後尺澤虛軟而代。至數不及。白涕不止。血崩下帶。

產後尺澤虛軟而代。至數不及。加之胃脈濡濕而散。卽水土俱寒。多下白涕。產後六脈浮而虛。腎脈微而小。至數遲。來處無力。緜緜若代。中風。肌肉麻痺。肢節牽抽。非時增寒。大府虛冷。

產後六脈浮而數。來疾而去遲。中風。血肢躁。身體疼。精神昏悶。大府祕澁。產後亂喫物早。傷損脾氣。非時腹脇脹滿。飲食不快。診其脈。胃脈遲而肝脈弱。

產後亂喫物早。傷損血氣。身體虛弱。飲食減少。眼如猫兒眼。診其脈。肺脈橫格而肝脈乾。傷微弱。腎脈泛泛欲動而無力。此血氣俱病。當調其血。益其氣。暖其胃。使進食。

產後腎脈微而沉。胃脈濡濕而沉。多緣寒氣所損。忽因坐草多時。地之寒氣所損。忽因坐草多時。地之寒氣所衝。腹中成塊。忽衝心背。臍腹疼痛。嘔逆惡心。不思飲食。

產後血氣微弱。六脈沉細。重手取之。細細乃得。脈氣別無陽脈。唯肺脈差浮而弱。主頭冷重。項頸瘈。非時間頭面上肌肉麻痺。大腸虛冷。頻出後。又多虛往。或時泄瀉。兩足沉重。少精神。行步無力。面黃瘦。或未經百日。經候通行。或誤喫涼藥。有此疾候。忽自懷孕時間。通身寒冷。至產後。却有此疾。但極以補腎補肝藥補益其血氣。而祛風邪藥助之。

產後心虛中風。心中戰慄。驚動不安。如人將捕。大府傷冷。六脈微而肝心脈偏細沉。又產後只緣腎氣之虛。寒風邪所中。腎脈細而搏。以沉。腎既受病。傳其所勝。心感腎邪。非時驚悸。如人將捕。初以益心氣去風

邪藥治之。次當補其腎。又次當益其肝。足其血。緣心受腎邪。而又肝氣微弱。不能生其心氣。故以三方藥治之。

產後肝腎虛冷受邪。六脈虛微。腎脈搏沉。心脈輕帶滑。主產後肝虛中風。產後血暈之疾有二。風搏血熱而暈。卽六脈洪大。有骨力。又有一般大府虛冷。却因使性激怒。傷損肝心。其氣上逆。因而血暈。其狀頭覺重痛。昏昏如醉。語聲低小。但多思睡。診其候。六脈輕。有骨力。不至洪大。肺脈輕浮而不毛。心脈促而朝上。此最爲用藥之難。故作此一方。

麻黃去根一分　延胡索　芎　防風各一分
官桂去皮半兩　甘草炙　細辛各二錢　羌活
木香各一錢

右爲細末。每服一錢半。水一盞。煎取九分。非時。去滓服。不要多服。病止卽住藥。若氣體虛微。喫煎藥未效。却加壯熱頭痛。面赤如醉。宜服此方。

牡丹皮　荊芥穗　羌活　麻黃去根
防風各一分　甘草二錢炙

右爲細末。每服二錢。水八分一盞。煎一兩沸。急瀉出。食後。徐徐去滓。熱服。病已卽止。

產後。餘惡血未下。因感風邪。與熱血相搏。壯熱頭痛。面赤如醉人。眼瞀瘛急。昏悶不醒。身如在虛空。見食

卽吐。食不住腹。脈氣結而不勻。逐位間絕。然各有骨力而微。此用藥亦難。宜此方。

麻黃去根三錢　麥門冬　黃芩　羌活

大黃　荆芥穗　山梔子　芍藥

射干各半兩　官桂　當歸各一分　甘草炙三銖

右爲細末。不要煑。只生擣。每服二錢。濃煎薄荷湯調下。若脈氣極有骨力。應指而動。又當有伏涎。當大府祕熱。出後不通。前藥二錢半。取汁用。調下牽牛末一錢半。夏末一字。和滓服。大府不熱。不用牽牛。

載之治病、用藥初不求異。炮炙製度。自依本法。以銖計者。蓋其審證精切。不過三四服立瘉。踰是而不效。乃察病按方之不審。便當改轍。不可泥也。此皆親試而得之。非敢夸大其說。六銖爲分。四分爲兩。

史載之方卷下

診胃脈

訣云阿阿緩若春楊柳此是脾家居四季此叔和知之而未詳也大抵胃脈雖和緩而貴不疾不速重而取之不虧乏浮而取之阿阿而至不洪不濁卽爲五藏脈全若弦而急又洪大而有骨力卽受肝熱邪能生嘔逆若弦而緊卽受肝冷邪能生殞泄訣又曰脾數卽吐因脾熱此非脾熱乃肝熱而侵脾故作此和神之方須使去風邪藥以和胃藥此方神效但於使療處方覺其驗

訶子皮 壹兩　　削朮 好者二兩　　藿香

陳橘皮　　芎　　獨活 此止風各半兩　　根子 七銖此用行肝氣乃木香中揀圓小氣烈味苦者

細辛　　防風　　甘草 炙各一分

右爲末每服三錢水一盞煎取八分去滓和滓任意服餌才服逡巡却覺胸膈如飢若是肝熱刑脾而吐唇焦口膠面赤渴引飲小便赤背脊寒洒洒如瘧開暖藥臭只要涼水喫卽加

荊芥穗 二錢　　羌活 半兩　　連翹 壹分　　秦膠 三銖

乾薄荷 壹分

已上同爲末每服三錢更入半夏二片水一盞生薑三片同煎至七分服若是脾濕冷泄卽加

香白芷壹分　肉豆蔻　草豆蔻各半兩

如法修製。大抵用脾藥須要止風邪藥相並。其他加減。乃臨時看風氣多少。卽萬不失壹。脚膝下邊生瘡。乃肺氣不下降使然。宜服降肺氣湯藥。

有病。吐半月不已。乃心鬲間有涎。宜用天南星去涎藥去之。

水邪攻心氣。素問云。攻所熱者死。用桂與薑。壯心氣勝之。其病。狂言身熱。骨節疼痛。面赤。眼如拔。而腦如脫。

小便白濁而口乾。是土氣餘而克腎水。以枳殼散清其脾。則安。痔病用荊芥薰。以釣腸丸服之。方出靈苑者是。

爲醫總論

道之渾淪。莫知其源。道之既判。變化無窮。莫知其端。推其變化之間。凝而爲質。五行名之。化而爲氣。五運統之。鍾而爲人。五藏應之。自此而後。物之可名。數之可推。理之可窮。而道之迹乃可得而言之也。大而天地。小而一身。理或皆然。統而論之。要其所養。一歸之無失而已。故雲霧不精。則上應白露不下。白露不下。則苑槀不榮。乃至賊風數至。暴雨數起。天地四時不能相保。與此天氣不襲。道之相失也。人之起居乖宜。將養失度。一藏有餘。一藏不足。寒溫之不能相交。榮衞之不能相通。風之氣乘隙而入。疾如飛矢。奇病苛疾。應如反掌。此天地之與人。其理未嘗不一矣。古之聖人。和於陰陽。調於四時。春夏養陽。秋冬養陰。與萬物浮沉於生長之門。故生身無奇病而壽敵天地。無有終時。此無他。養無失而生氣不竭者也。賢人則上

配天以養頭。下象地以養足。中傍人事以養五藏而無失。亦可益壽而有極時。至於庶人。不能法天之紀用地之理。失於所養。天之邪氣感而害五藏。水穀之寒熱感而傷六府。地之濕氣感而害皮肉觔脈。百病無端。從斯而至。病之一生。千變萬化。莫能窮究。故世之善醫者。不患治病之難。患識病之難。患使藥之難。何則、受病有淺深。使藥有重輕。度其淺深。分毫之不可差。明其輕重。錙銖之不可偏。淺深輕重之間。醫者之精粗。病者之性命。差之毫釐。失之千里。得失之間。死生性命之所係。醫之道、不得不爲之難也。故善爲醫者。一病之生。必先考其根源。定其傳受。審其刑尅。分其冷熱寒溫。辨其上下內外。有眞有邪。有虛有實。忽隔絕痞塞不通。忽空虛微弱失守。可針可灸。可下可汗。闕於不精。勇於必驗。制之有先後。取之有輕重。條理具存。各有其常。而不可差之分毫也。夫病之所起。其來有根源。其次有傳受。其傳有刑尅。此非常之證。勞傷之候也。夫勞之爲病。始於丹元髓海之虛。則眞病之所生。莫不先在於腎。水能勝火。故傳之於心。火能勝金。故傳之於肺。金能勝木。故傳之於肝。木能勝土。故傳之於脾。五藏相傳。五氣相滅。五神耗散。榮泣衞除。而精神榮衞。治之之法。其根在腎。而未傳於心者。投之以腎邪之藥。而其氣自損也。當於腎之未治。而傳之與心。先治於腎。攻其鬼而伐其根也。次治心。逐其邪。而保全其心氣也。當於心之未治。而傳之與肺。涕唾膠粘。喘嗽不安。先治於心。攻其鬼而斷其相傳之勢。火邪撲滅。肺藥未投。而喘嗽之消滅。十亦去八九矣。次治於肺。解其邪。而保安其金氣也。後治於腎。淸其藏。而還其眞氣也。當此未治。而至於肺傳之肝。觔骨痿痺。隱伏於床。治之亦徒勞功。如此所爲。考其根源。定其傳受。而審其刑尅也。夫五藏溫病安

從來將養乖宜病生於變是則百病之起雖千變萬化之幾而要其所歸不出於寒溫熱冷而已冷者不可治之以溫名曰不及涼而治之以熱名曰太過不及者病之不能滅而太過者反有所傷於眞氣也冷者熱之寒者溫之輕重得宜疾徐有制動無毫釐之失而所療之病舉獲萬全此所爲分其冷熱寒溫者矣傳曰狂風入林枯枝先折猛雨破堙隙者先壞則入邪之所以感傷於人莫非乘隙而入此人之所病不能無內外上下之辨也肺氣喘嗽膠痰堅實伏在胸中潮涎併起傾損性命如此之類病在上也脚膝痿軟行步無力腰膀沉重如此之類病在下也生於皮毛染於筋骨忽寒所中飲食不消忽熱毒所攻大府祕澁百端隨人冷熱如此之類病在內也在上者吐之而安然不可吐者當制之以緩在下者補之而愈然不可補者當制之以急在外者可針可灸可汗隨其所宜而在內者可攻可補可下隨其冷熱而已其治之有方其辨之有法亦何患乎所投之藥無必勝之驗者哉此辨其上下內外者也夫五味爽人之口五色盲人之目嗜慾無窮貪着不已憂患迭生精神弛壞而眞殘根伐是人之不能無虛實也實者爲有餘虛者爲不足有餘者瀉之不足者補之而補瀉之間又有內外之辨故形不足者溫之以氣精不足者補之以味五藏六府之內實者通之以藥餌四肢八節之外實者瀉之以針石刺此其補瀉之有所不同也乃所爲分其虛實者矣夫古之人年滿百而動作不衰今之人年未滿五十而動作有衰非天之私於古而禍於今也古之人知養道之術嗜慾不能勞其目淫邪不能惑其心血氣安和精神內守故年滿百而動作不衰蓋眞全而邪氣不能勝也今之人不知養道之術務快其心逆於生樂血氣枯衰精神耗

散乃有胎胎相傳病病相孕受氣虛微肌體羸弱呼吸喘息之間而百病臻湊於五藏六府者矣此無他精虛神乏而外邪得以干其陰陽之正氣也善爲醫者保其眞去其邪無使其過劑之藥反有以賊其眞也此所謂分其眞邪者矣乃至有隔絕痞塞不通空虛微弱失守雖三尺之童亦耳聞而心識者矣夫病之在內藥餌攻之病之在外針石取之其有病勢之急而藥石之功緩而難制聖人不能灸之法類而舉之若今陰毒傷寒其四肢八節皆冷面青脣黑不知人事急於氣海灸之一灸不過十數壯而人神氣完復矣又有夏暑之月任意取涼頻飲涼水忽飲冷酒後恣貪色慾精氣至虛陰邪壯盛陰陽相奪陰氣偏勝獨守下元陽氣虛微上攻頭項其病脚冷如雪四肢八節俱寒脈氣深伏但有其熱如火其痛難忍方此之際針石何濟急於氣海上灸之一灸不過數十壯而日前之所飲涼水冷酒皆轉下須臾四肢八節俱暖而陰陽之氣仍相交際者又有冷熱之癰腫忽鮮赤而疼痛忽堅硬而不痛急以濕紙帖其上尋其紙之先乾處便灸一灸至百壯餘而後止若以冷腫而紙上不得其先乾處卽於腫處當頭着灸亦以百壯而止但量肌體厚薄方可安灸瘦薄者少灸肥厚者多灸忽是冷腫灸而不痛則以閒痛而止因喫硫黃後有此病更在虛處不請安灸夫病之可汗可下可針可灸其緩急之序重輕之別操之不失其宜施之各有其度又何患乎人之不安病之不愈者哉嗚呼天地無全功聖人無全能雖黃帝、岐伯之論尙有不治之病則今有非常之候不得其詳未明其實闕而勿治醫者不爲之辱也苟其病之熾盛人之危篤醫者既明其理又識其詳當此之時不可有分毫之怯急以毒藥驗針回其生於萬死之地舉必萬全然

非至神無能與此。愚者行之無異於操刀殺人也。如此所爲闕於不精勇於必驗者矣。此皆持之有術治之有統不可相踰於規矩權衡者也。至於病之有非五行之所傳化若寒壅之相交陰陽之相伏忽似熱而反寒忽似寒而反熱忽兩寒兩熱之相攻忽有餘不足之相礙千變萬化而生人之大病苦今若肺藏本有實熱反因臨大風冒大雨極感於寒邪之氣寒邪之氣客於肺經寒熱相交發而成嗽醫者治之投以涼藥順其肺氣則助其寒邪之勢而嗽愈增投以暖藥則激其本藏之熱而加喘急寒溫之藥俱難以進則修方使藥之輕重當見於此或有以羌活

黃橘皮　麻黃去根　紫菀　杏仁去雙仁皮尖

細辛　獨活　防風　桔梗

右爲末每服二錢沸湯點空心服不過數服而嗽止此輕□□解其寒邪空心賺其寒邪之氣流出於胃也此所謂治其寒熱相交者矣忽有人之藏府根本實熱却因履天暑冒大熱驟入涼處頓飲涼水寒氣勝畏其熱氣陰陽相伏陰氣固而不散陽氣伏而不動其病結爲一塊伏在胸中此病名爲伏暑者也其候忽寒心中煩躁狀似傷寒而脈不甚數醫者治之妄投轉藥雖六府之精華悉皆蕩盡而心前之結塊愈增堅固此無他所下之藥助其寒邪之勢陰氣轉堅而不散也治之之法

芎　細辛　藿香　黃橘皮

木香各一分

右爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分爲湯。空心服之。先解其寒邪之氣。不移時而心前之結塊頓然消散。然後復審其脈氣。察其暑毒之輕重。必投藥以解之。則亦何患乎藥之不驗者哉。如此所謂治其陰陽之相伏者矣。夫病有似熱而反寒者。若今有產後之病。五藏積冷。陰氣偏勝。乳汁倍多。無故流出。口舌常乾。非時發渴。頭旋目暈。飲食減少。腸胃虛空。身體羸瘦。每思登後。忽又不通。淺學治之。不過曰口舌常乾。非時發渴。上焦之有熱也。頭旋目暈。血熱而生風也。每思登後。又忽不通者。大腸之祕澁也。是不知乳汁倍多。無故流出。則口乾而發熱。從可知矣。體氣虛弱。頭旋目暈。腸胃空虛。而傳送之氣不足。則每思登後。又忽不通。從可知矣。一旦誤以爲熱。而投之冷藥。豈不傾人性命於頃刻哉。病有似寒而反熱者。若今壯歲之男子。志在淫邪。恣貪補藥。以昏求色慾。熱藥所攻。榮衞結澁。上氣有餘。下氣不足。上下之氣不相交際。脚膝痿弱。行步無力。兩足多冷。或時增寒。肌體黑瘦。飲食減少。才喫醎味。卽便惡心。醫者治之。不過曰。此五藏六府之虛弱也。投以暖藥。譬猶抱薪救火。與甚亡益也。才以清涼之藥。解利肺經。散其毒熱。上攻之氣。榮衞一通。則其陰陽之氣。仍相交際。手足自暖。脚膝損輕。而平復如故矣。此所謂似寒而反熱也。夫歲陽太過。天地不無旱乾之災。歲陰太過。天地不無水潦之患。以虛生寒。以實生熱。則人之藏府。不能無兩寒兩熱之相攻也。若今傷寒所謂陽毒之類。皆兩寒兩熱之相攻者矣。哀哉。色慾無厭。喪身之本。世人多以迷心。恣其所欲。反飡毒熱之藥。以希苟活。其丹元髓海。雖已空虛。而藏府骨槽。虛熱轉盛。此病之所生。不能無有餘不足之相礙也。若今人之患大腸祕澁。忽五六日。忽十日。出後不通。小腸虛憊。日夜五六十

次每次小便仍有一盞半盞已來其清如水忽時黃色臨小便時其痛難忍甚則心神煩躁此肝心脾肺四藏之毒熱有餘而腎與小腸主氣不足也脾肺心積熱則腸乾澁腎與小腸虛憊則水道滑肝心積熱則其血沸溢甚則血黯黑熱毒之氣如煙如霧鎮在中焦因其小腸虛憊水道乘虛只行於小腸此所以小便雖清其痛難忍其病有似於淋而非淋疾天下物理有似是而非者正謂此也醫者治之投暖藥以固小腸而則滋其肝心熱毒之氣而痛愈加下涼藥通大府則藥隨水道只行於小腸而病愈盛冷熱之藥俱難以進此有餘不足之相礙也治之之法當以通氣藥爲湯洗其穀道先引其五藏之氣歸入於胃使其湯水稍隨氣而下入於胃第二度使水漸取得一兩箇下氣相次如藥取得些小乾糞氣歸大腸所餘湯水亦隨氣行歸入大腸則未喫小腸氣藥而小便自止也漸次使藥通其肝心熱毒之氣使出後稍通便下藥取其熱毒所取下物如半腐爛者淤血之類如此然後得其病根之消減也所下之藥具在方中此謂治其不足有餘之相礙也吁醫術如林余之所得芽孽而已醫道如海余之所得涓滴而已因其所得雖無寸長稽其用心實非古人之形於筆舌者今略舉數條論之於前以明醫道之大略而已

涎論

論曰舟非水不行然波濤沸溢則覆舟之患生人非氣不活然痰涎併積則傾人之患至波濤非自生也其所以生者不平之勢作之也痰涎非自積也其所以積者不順之氣留之也故善行舟者不懼波濤而懼舟之不完善攝生者不懼痰涎而懼氣之不順故世人之疾病其所以殘傷性命之急者無甚於痰涎

而世之醫者乃有見之而不能識忽有識之而不能治此不幸之人其殘傷夭橫者不可勝數何則舉天下之人獨知風氣之有涎不知藏府冷亦生涎熱亦生涎痰涎一生千變萬化而病之所起非特一端愚今略舉數端明之後之學者於診療之際類而推之亦庶幾其疾病之徒無夭橫者矣夫涎之爲名一也而具數種一曰風涎二曰熱涎三曰冷涎四曰病涎五曰虛涎六曰毒涎其一曰風涎蓋因人之風氣之盛上運於涎不能下入於胃風氣一蒸痰涎併起而上塡塞胸中卽使人悶倒無知其風氣久而不順性命之傾危速如反掌若其風氣未盛逡巡之間仍復自順其涎亦隨氣而下卽平復如故此蓋人之肌肉厚湊裏深風不得泄於外風熱內攻大府祕熱毒氣上攻遂生斯疾此名之曰風涎然風涎之爲名一也而人藏府虛實之不同則涎之爲病也變化不一愚得以命其變而言之若今人之病大府實熱痰涎滿口吐如清膠胸中喘息如常但湯水飲食俱不可進凡所飲食只到喉中卽不能下用力嚥下卽喉中隔絕喘急悶倒良久方愈惟進得些小膠粥此亦風涎之候也然風涎之候變不同則當如何而治之曰善除荊棘者先斷其根善治風痰者先順其氣人身無倒上之涎天下無逆流之水今風痰一上而塡塞胸中傾人性命者風氣運而上也今之治風涎者多使天南星半夏之類是不知病之源流去荊棘而不除其根也苟能以藥先順其風氣兼發其湊理使其風氣得以發泄於外順行於內則其胸中之痰涎自隨氣而下未喫涎藥而痰涎自順矣然病勢之有輕重則取之有緩急若風氣炎盛膠涎併起其氣卒難以順之者當制之以急非吐之不可風氣未極痰涎未併爲害未深者當制之以緩先順其氣而後治其涎

也。此亦治涎之大約也。然風涎之候。又有冷熱之不同。或有寒風所中。冷涎所聚。其人必先於半年或數月前。喫食減少。身體沉重。筋脈痿弱。才見肉味。便覺惡心。非時口中一兩點冷涎出。身不自覺。冷涎所併。忽悶倒不知人事。良久復蘇。卽生麻痺。或生䶮曳。或失音不語。冷涎所積。少有上併。多聚中焦。盈溢胸中。包裹心絡。能使人狂言妄語。神識不定。非特不覺手臂忽自舉動。如此爲冷涎之所中也。治之法。先以溫暖之藥。散其冷毒之氣。急以熱藥。發其腠理。然後以治涎之藥。取下其涎。雖且暫安。而寒風所中於人。亦甚不久。何則。熱風中人。如天地春夏之風。長含生氣。以養萬物。其人雖病難死。此古人所謂風所以能養人也。寒風所中於人。如天地秋冬之風。長含殺氣。以肅殺萬物。其人所中。非久必死。此古人所謂風所以能害人也。其二曰熱涎。若今有取性之丈夫。多飡葷膩。好食鹹酸。以色爲心。恣貪補藥。忽因醉酒房室。勞傷其精。丹元髓海。雖以空虛。而藏府骨膽。虛熱轉盛。其涎所積。隔在中焦。因其腎藏之虛。寒邪氣與熱涎相交。發爲疼痛。重則不移時而傾人性命。醫者治之。不過曰。此肝腎之氣。是不知熱涎乃病之根本。然京三稜、蓬莪茂。非能治氣。而世人用而不驗者。不識其病之源流也。善爲醫者。臨事制宜。隨機應變。審當輕重。涎多者吐之。涎少者下之。所用之藥。偏取肝家之風毒。又何患乎人之不安哉。三曰冷涎者。若今人之肝藏有餘。脾氣不足。忽因使性。長懷淤怒。傷損肝心正氣。此冷涎之所以積也。脾氣不足。復因肝氣所乘。伏而不動。停水滯穀。久而不化。肝心長懷淤怒。則其氣滯澁而不行。此冷涎之所以積也。然肝生風。性之不定。忽時而作。肝主怒。怒則氣逆。此冷涎所以隨氣而上。而生人之大病也。證其候而言之。則其病必先

聞心前潰亂不快。相次聞有一物。隨氣而上。觸至咽喉。即悶倒不知人事。手足肌肉、漸次寒冷。逡巡復平愈。治之之法。當以吐藥取之。得其所取之涎。其清如水。其冷如雪。取涎之後。復審其藏氣。隨其所病而調和之。亦無患乎藥之不驗也。四曰病涎。其人必好食堅硬之物。傷損脾氣。忽因淤怒。傷損心肝正氣。忽因寒邪熱毒之傷。忽因大病之後。餘毒客在藏府。其氣結澁昏滯。不能宣暢。是以痰涎因而聚積。涎與滯氣相交。往往發爲疼痛。此名之爲病涎者也。明其病證。在心前痛。輕則連年累月。痛無暫停。重則傾人性命。速如反掌。重輕之殊。涎之多少也。治之之法。當在量其病勢輕重。以利藥取之。輕則其涎如油。重則其凝如白膠。取涎之後。然後使藥清其藏氣。益其正氣。使之平復如故也。五曰虛涎。其人必因受氣之虛。忽因大病之後。生冷所傷。忽因疾病之間。淫慾不節。致令藏府之氣。空虛羸乏。而骨膽之間。虛熱上蒸。上氣鎮長有餘。下氣但常不足。陰陽之氣。不相交際。不順之氣。隔在中焦。是以虛涎因而積聚。風熱一攻。即其涎併上。初發作時。先覺清涎滿口。漸聞心前有一物。上觸咽喉。即喉中急促。悶倒不覺。兩手相亂把拽。風氣極上。即頭上瘙。忽皮膚間痛。逡巡風氣順下。乃遂平復。治之之法。當以臨發時使五分利藥取之。以其胃氣不足。不可十分利吐也。若利吐不出。非時以壞風涎藥攪之。候分數少減。即於氣海上安之一炙。引其涎下入於胃。然後使藥調其藏氣。酌量其藏府之虛實。有餘者瀉。不足者補。令上下之氣相等。可庶幾其全安也。若脈氣微細。大府虛冷。減其肝氣。益其胃氣。斯可矣。若小兒得病者。全是胃氣之虛。氣海上安炙。補暖脾胃。以愈斯痰。仍不輒喫取風涎藥也。六曰毒涎。若今人之患陽毒傷寒。肝心脾肺受其疫毒之氣。

因其毒涎相積聚在中。候其證。即使人大府祕熱。小便黃澁。面色黯赤。渾身發熱。昏昏如醉。狂言妄語。不知人事。如此之候。悉皆是涎。診其脈氣。又却沉伏。重手取之。骨間乃得。此乃疫毒之涎。盈溢心胸。伏其脈氣。非脈氣之與病相反者也。此所謂毒涎者矣。治之之法。急以疎轉之藥。取其毒氣。蕩下其涎。所下之藥。須心肝脾肺四藏俱治。然當以肝藏爲主。偏下肝藏之藥爲要也。雖然。涎之爲病。千變萬化。其狀不一。是今之所舉數端。止其大略而已。後之學者。類而推之。加以識見之明。而診療無差。亦無患乎涎爲人之大患者矣。

治涎諸方

凡人得一句病證皆可喫此藥只有此方內一件

治一切丈夫婦人風涎所積。非時急飢。見食即飽。心中嘔逆。一切飲食。都不聞味。口中涎溢。唾如濃膠。急即吐逆。食不住腹。面色青黑。肌肉乾燥。唇皮焦赤。忽時黑色。兩脇下氣跳。忽衝脇下跳戰。轉入背脾痛。遍身肌肉。忽時跳戰。兩臂沉重。忽如有物壓着。夜間都睡不着。忽如有物上觸咽喉。即昏悶不醒。須臾仍却無事。忽時如有物纏繫腰背。忽時有物橫在背上。腰背疼痛。忽滿口生瘡。忽時下赤糞。忽時泄瀉不定。頂上躁熱。小便赤色。通身發熱。眼色勁急。忽時心躁。熱上攻胸。額發汗如水。忽時項上皮肉間疼痛不可忍。忽時心前脇下迸重。如懸一片物。忽聞重處非時麻痺。忽身上肌肉結塊連綴。疼痛不安。忽時頭面小腹兩脚都腫。若是婦人。連陰門腫。忽起兩眼迸痛。視物不明。若有此候。月水不行。通得月水。方爲安校。忽時聞在兩脇下起。衝入胃管。上築咽喉。昏悶不安。須是開口仰項吐氣。方得稍快。忽時如有亂蟲咬心肝。不

可眠臥忽時聞氣在手指足指甲起相次聚入胃管即便大發熱昏絕不醒人事須吐氣千百聲良久方蘇如此是藏府有積毒風涎之所致也凡人不安有此內一件病證皆可進服此藥但論輕重加減服餌喫此藥後四肢八節肌肉毛髮俱軋軋然有聲即藥之驗也此涼藥也喫後大府反熱即取病之證也此病有根受之太深此藥不輟進服徐徐減病根若病勢濃者急炙肝俞減其風氣若是大府結澁更添下面藥數味喫安校若是太歲過六壬丁卯己亥之年常有此候己巳己亥年其病尤甚若遇己上年辰雖無病之人亦可喫此藥免得生病

治風氣取涎方

荊芥穗　麻黃去根　薄荷　羌活

連翹　防風　獨活　芍藥

木香　乾蠍　僵蠶去絲各三分　牽牛半兩

半夏三銖　山梔壹分

以上細擣爲末每服貳錢食後煎生薑薄荷湯調下和滓服若是大府祕熱膠痰滿口喉中嚥藥不快只請去滓喫候風氣少利即和滓喫也若是大府祕不出後即用大黃壹分半夏三銖牽牛一兩半共三味擣羅爲末作一處每服用上面藥末三錢牽牛等末三錢共計六錢滴熟水丸如梧子大爲一服巳午時慈湯下大府尚不通忽穀道中通糞不下即用皂角牽牛二味擣羅爲細末筆管盛內於穀道中吹之翦

去指甲。用指頭穀道中撥取乾糞下也。

痢論

夫痢之爲病。世人所患者多。然方册所載者。未嘗有必驗之方。古人所談者。未嘗有卓然之論。服餌之間。世人夭橫者。莫知其數。此聖人名方爲大奇。後之學者、不能思而自得之也。若今有人得一名方。自以爲神傳聖惠。應効不測。然有一人服之而減。未可圖其必然之驗也。此愚以方册所載者。未嘗有必驗之方也。以赤爲熱。以白爲冷。醫者之辭。萬口一說。此愚以爲古人所談。未嘗有卓然之論也。何則、以赤爲熱。以白爲冷。赤白爲冷熱不和。獨知大綱。而痢之有變化重輕之別。得其粗而不得其詳。知其一不知其二者矣。夫痢之爲痢。一名而具八種。一曰白痢。二曰赤痢。三曰赤白痢。四曰水穀痢。五曰血痢。六曰疫毒痢。七曰休息痢。八曰小兒疳痢。此皆受之不同。治之不得不異。索其詳而論之。則其痢之爲病。雖變化重輕之不同。然一歸之脾氣之虛而已。

萬物非土不生。五行非土不載。五藏非脾不養。脾者、中州之土。能化腐水穀。設滋味於肌膚。行糟粕於大腸。脾藏温和。而諸藏之有冷熱不調。卽自生他病。不爲之痢也。是故赤痢雖熱。本因脾腎之虛。赤白相雜。雖爲冷熱不和。而又有重輕之別。若今人之下赤痢。先轉數行。而後有赤痢之變。若以赤痢爲熱。何乃有先轉之說歟。以赤白爲冷熱不和。而復有赤少白多。赤多白少。能無重輕之別乎。此病有變化之不同。予得以命其祖而言之也。一曰白痢者。五藏傷冷。脾胃極虛之所成也。其得之重。出後如雞卵清、如魚腦漿

者。腎有所傷也。急以補脾腎藥以暖之。加以舶上硫黃丸。無問多少。空心卽服。以止爲度。蓋病勢之重。治之不可後時也。二曰赤痢者。三焦之熱血有餘。而脾腎感寒之所成也。夫肝心積熱之人。多食生冷。愛喫涼水。口之所納。都聚於脾腎。寒溫之氣所傷。而肝心氣變。血損於中。此肝心之血乘脾之虛。滲入大腸而赤痢者也。先服解寒氣藥。次喫暖脾藥。其治之如反掌爾。三曰赤白痢者。心肝血損。而脾之與胃。藏腑皆虛之所成也。脾氣之虛。則肝氣相乘。胃氣之虛。則停水滯穀。凝而爲涕。肝氣乘脾氣。則肝心之熱血乘脾之虛。滲入於大腸與胃中之涕相雜而下。此所以爲赤白也。忽有赤少而白多。忽有赤多而白少。忽有赤白相等。此受病有淺深。下藥有輕重。當在臨時度宜。隨機應變。不可差之分毫也。愚初以謂赤多而白少者。清利肝氣而輕暖脾胃也。白多而赤少者。微清肝心之氣而甚暖脾胃也。赤白相等者。微利肝心。平益脾胃氣而自愈。但發寒熱爲最重。方見痢方中。四曰水穀痢。其人多飲涼水。忽餐生冷之所成也。所下之痢。悉皆黃色。忽時下白沫。治之之法。補暖脾胃。而其疾自愈。五曰血痢。其人多淤怒。因更相毆擊。忽因焦熱極。驟食生冷。脾胃損虛之成也。所下之痢。多黯赤色。無寒熱者。清其肝心之氣。而疾自去矣。六曰疫毒痢者。毒氣所傳。一坊一境。家家戶戶。更相染易。無有不病。凡下痢之時。忽先發寒熱。忽先轉數行。忽生冷所傷。因而下痢。所下之利渾是赤色。濃如膿涕。忽時半盞下濃血。腹中刺痛。忽心中煩躁。三焦否隔。全不思食。此名爲疫毒痢也。然則疫毒所主五藏。從何而得。經言。春若傷陽。夏必人多瀉痢。此疫毒之根。先受之於肝也。夫春氣本和。而反傷於熱。此陽氣所勝。肝家受熱。而其氣有餘者也。經言五行受病。必先傳其

所勝。則肝之得病。必先傳之與脾。而世人於夏月之間。多食生冷。傷損脾氣。脾氣虛。肝邪得以乘之。而脾受肝邪。伏而不動。莫能消水化穀。此疫毒之痢。必先轉數行。而後有赤痢之變也。先轉數行者。脾受邪而脾已生病也。後有赤痢之變者。肝之血熱乘脾之虛。滲入大腸。而爲赤痢也。中間忽有赤白相等者。此肝之毒血。雜胃中之寒涕也。若發寒熱。方見痢方中。有白少而赤多。或有白多而赤少。肝之邪毒。有輕重之不等也。七曰休息痢者。蓋患痢之人。其治痢之時。不能解肝邪。而肝家餘毒之所成也。脾藏久受肝邪。則不能強健消化水穀。是毒痢之所下。纏綿久遠而不較。此所以爲休息也。八曰小兒痢者。蓋小兒肝受熱。而相刑於脾之所成也。肝之刑脾。則所下之痢。全是赤色。或赤白相雜。至脾之自受疳氣。則骨肉消瘦。所下之痢。多黃涕白沫。少有赤色相雜也。如此數端。亦治痢之大略而已。至於醫道之淵微。愚不能知其妙。

治痢諸方

治脾胃虛冷。停水滯氣。凝而成涕。所下之痢。渾是白涕。宜喫此方。初得痢時。並無壯熱頭痛。方可喫此藥。

舶上硫黃一兩細研如塵

右以白麵一分。鍋內炒令熟。放冷。於乳鉢內。與舶上硫黃末同研令勻。滴熟湯丸如梧桐子大。每服五十丸。以止爲度。空心溫米湯下。若初得痢時。卽不可喫此藥。

治脾胃氣冷。相刑於腎。土水相攻。寒濕交爭。所下之痢。全是清涎。有如雞卵清之類。宜喫此方。將舶上丸相間服。

石斛去根　白朮　吳茱萸

草豆蔻去皮　芎　乾薑　續斷

防風各一分　訶梨勒逐箇麵裹火炮熟去核只使皮秤半兩　茯苓壹分

牡礪一分火煆通赤

右以上細擣羅爲末煉蜜丸如梧子大早朝空心温米湯下五十丸空心服有壯熱不請喫治三焦壅熱其血流散乘脾之虛滲入大腸而所下之痢盡皆赤色別無白痢相雜並不壯熱亦無心腹疼痛診其脈上都洪大脾脈多鼓而沉大宜服此方候上焦氣清赤痢消減忽變成白忽赤痢減後却聞得小腹迸脹即便脩合後方喫取平安

麻黃去根　防風　麥門冬去心　獨活

木香　牡丹皮去心　前胡去毛　荆芥穗各一分

蒲黃四錢

右爲細末每服二錢食後熟湯調下去滓服候赤稍減忽變成白忽聞小腹膨脹即依合後方喫也

治赤痢喫前方了忽變成白忽已校可忽聞小腹膨脹宜喫此方

防風　甘草炙各一分　芎半兩　木香三錢

訶梨勒麵裹火炮熟去核只使皮半兩

右爲細末每服一錢半水一盞煎取九分空心和滓喫

治水穀痢。所下痢並無赤色。只下黃涕。忽時下白沫。飲食減少。肌體黃瘦。宜服此方。

訶子麵裹火炮熱去核只使皮一兩　黃橘皮　白朮　芎各半兩

甘草四錢　肉豆蔻一箇　舶上硫黃細研一兩

右擣羅爲細末。用舶上硫黃相和令勻。用薏苡仁作粉煮粥丸如梧桐子大。急火焙乾。每服五十丸。空心。溫米湯下。須是焙乾。莫令損藥氣。治赤痢。所下之痢渾是鮮血。忽有黯色。據候多因使性瘀怒。傷損肝心正氣。忽因事爭打。傷損經絡。致有斯疾。

桑寄生壹兩　獨活　木香　甘草炙

芎　牡丹皮去心各一分

右爲細末。水一盞。煎取八分。非時喫。每服二錢。

痢藥須子細對證用之。取效如神。大抵此一集力無不粗妙。但要病藥相對。

治疫毒痢幷論

凡疫毒痢。一方一境。家家戶戶。更相染易。無不病。緣疫毒之痢。非獨一般。證候多端。根源奇異。雖神農、岐伯。尚以爲大奇之病。後之學醫。未識其粗迹。豈知其津涯。但言白痢爲冷。赤痢爲熱。赤白爲冷熱不和。不知有何經證。以白爲冷。偏下暖藥。幸亦無差。以赤爲熱。不知熱從何藏。愚者妄言。不過曰熱從肝心。因何無涼肝心必驗之一方。定治赤痢以行於世。以赤白爲冷熱不和。又不知指稱何藏。愚者妄言。不過曰冷熱氣不和。復不知因何無和氣藥一方。定可用治赤白痢以存之方册。醫家自不知病在五藏。從何而生。

只務檢方行藥。幸而偶有所中。人且獲安。不幸而差之毫釐。所投之藥。乃暗中興戰。但病者不見痕迹。所傷無能知覺。觀之得不寒心。吁。神農之後世世學醫者。未明天地之氣候。不識五藏之應變者。不能知常病之源流。豈足與語奇病之變化。是以痢之一病。方册所載。古人所談。未嘗有一言一句略明其粗。予嘗探尋五運之氣數。稽諸天地之變化。推步六氣之行度。參考脈氣之纏注。以天驗人。以人應天。痢之一病。億萬分中少知其一二。但以其變化之間。獨可神悟。難以言窮。筆舌之間。不能曲伸其旨。使後學者洞識精微。而無悟人之性命。深以爲恨。今但子細陳其粗迹。以爲後之醫者。筌蹄。在詳審而用之。適足以知我之用心。誠爲愛人之切爾。經言。春若傷陽。夏必久多瀉痢。此之一節。無問太歲。但一春之間。早有炎暑暄熱之化。至於夏月。忽生瀉痢之病。通其肝氣。其病卽愈。但兩三盞無驗。更不請喫。若少有效驗。喫之以較爲期。蓋痢之一病。證候多端。藥中其源。卽便安校。故無在於多喫也。切慮世醫誤認證候。妄投藥餌。以傷性命。但患痢之人。所喫之藥。兩三盞不見効驗。更不請進服。今自有方。具其變之候。備別于下。更在詳擇而用之。永無差誤。緣疫痢之狀。變證多端。予請以

太歲推之。

子午之年。君火司天。土性生金。火性制金。土火交生。濕蒸相搏。則宜其土有所潤。火有所瀉。火氣見鬱。心氣內傷。乃生赤白血痢。寅申之年。相火司天。土火並化。氣味交通。與此同候。丑未之年。太陰司天。土化流行。土火交通。濕熱並至。子母同化。性不相侔。溫濕攻心。脾鬱。心氣內變。血淤於中。注下赤白。且子午年、丑

未年、寅申年、土之司天則異。而氣化之生病則同。何也。答曰。夏秋相交。火金相繼。土之一氣。常遊於其間。土有所潤。暑有所溽。然後金生。是以火土二位。氣位交通。事理相混。其所以司天之歲雖殊。相鬱而生痢則一也。方見下。卯酉之年。陽明司天。金行其令。氣化淒清。人少脾病。六月七月。水火相犯。八月九月。金木相攻。水之與木。一化有餘。赤白下注。從此而生。是歲君火司地。少陰在泉。火能制金。一旦於歲中火淫所勝。焰明郊野。則化來救寒。更作人病。赤白在下。己亥之年。少陽在泉。相火司地。與此同化。然君火之化善。相火之化惡。善則傷人遲。惡則傷人速。治同法。方並見下。

辰戌之年。太陽司天。水化流行。寒邪犯心。血氣內變。傷損於中。因而下注赤白。此病世之罕有。蓋傷犯人之急也。但

辰戌年之痢。發熱如火。當痛。所下之痢。如紫草水。如膠涎。如茶脚。不急治之。其亡也如反掌。方並見下。

己亥之年。厥陰司天。木化流行。土木相交。風濕相爭。脾土受邪。此肝之熱血。乘脾之困。滲入大腸。而生赤白瀉痢之病。方見下。

已上天地氣候。推之未詳。予請以五運之政推之。

甲子、甲午。濕化有餘。丙子、丙午。寒運太過。庚子、庚午。上受天刑。必有水救。已上年辰。天地相過。剛柔始交。月氣是水與天相犯。水火相持。以爲一年病始。更遇寒濕之運。與水相助。忽受刑之運。有水相救。已上年辰。歲半之前多有淸肅之化。至於夏月。氣候反寒熱交爭。乃生赤白之痢。爲此寒濕犯火德之與常例不

同。自有方在下。子年爲甚。而午年少減。若寒化偏多。陽化少舉。乃生寒瘧傷寒麻瘡之病。痢疾乃加。戊子年上爲天符。戊午年天符歲會。氣以之詳。人以之寧。一旦寒濕之氣少犯於心。忽注下赤白。人多患暴死。有此證候。治之亦與丙申年同。議者謂戊子、戊午年天氣運氣皆是火。今乃言忽有寒濕犯心何也。答曰。己午之上有戊己之土。當有寒濕之化。與火相持。然後使金得而生。此戊辰、戊午年亦疑有寒濕之化相犯於心也。經言。中執法者。其病速而危。中行令者其病徐而持。中貴人者。其病暴而死。蓋以此也。

壬子、壬午。木運相助。風熱大盛。木能制土。脾乃受邪。若此歲中忽有大風炎熱之勝。人生瀉痢之病。其鬼在肝。方具於下。然子午之歲。地之初歲。寒邪與天相爭。丙丁之位。與戊己共居。若於歲中反有寒濕之多。所生之痢。治亦與甲子、丙午、甲寅、甲申、丙寅、丙申、戊申、庚寅、庚申、壬寅、壬申年。氣候大約與子午年同。所生之痢亦同。法方並見下。

乙丑、乙未、丁丑、丁未、己丑、己未、辛丑、辛未、癸丑、癸未、己上年辰。每一年之運。各管三氣化。乙丑、乙未。金運本涼。以其氣之不足。反與少徵同化。然火土交味。太陰所寓。熱化並行。濕熱相持。心氣內鬱。血損於中。注下赤白。忽火之不常其德。侵傷其不足之金。則水必相救。寒邪犯心。因而生痢。此乙丑、乙未年之痢。忽有以土之鬱火而生。忽有水之犯心而成。其受病臟腑雖不同。然土水共胞。寒濕同化。則其治大同而小異也。方並見下。經言。其運涼熱寒。蓋以此矣。向下准此而推。

丁丑、丁未。木運正。風與天土相犯。然以氣之不足。反與少商同化。若於歲內。金之不常其德。多有清肅之

化。則火必相救。炎暑將至。與土相持。而濕熱相交。血氣內損。乃注下赤白。然丑未之年。天能制色。土將犯水。木雖不足。而其怒無時。忽若風化大來。土木相戰。則肝發傷脾。此丁丑、丁未年之痢。忽起於肝。忽生於脾者矣。方見下。經言丁丑未之年。其運風涼熱蓋以此也。

己丑、己未年。天符歲會。氣以之詳。物以之寧。人以之安。然太陰之味。先苦後甘。氣化相交。土性生金。火性尅金。忽於歲中火土相攻。心血內變。痢疾所生。人多暴死。此蓋邪之不可侵傷於貴人也。方見下。遇此年辰。常喫調和脾氣藥。以安貴人。是服食之宜也。

辛丑、辛未水運不足。雖上受天刑。然下加太陽。反歸乎氣。是歲天土地水。寒濕偏多。火氣見鬱。若有痢之疾生。其起在心。其鬼在於脾腎。方並見下。

癸丑、癸未火當其運。其氣不足。反與少羽同化。是歲太陽在泉。寒氣不減。寒濕更作。火氣見傷。痢之所生。其病在心。其鬼在脾腎胃。方並見下。

寅申之年。大約與子午年同。但相火之政暴。遇其獨勝。則其害立至。若與水土相犯。其候變證多端。方具於下。

乙卯、乙酉年。金運不足。本與少徵同。然乙在卯上。爲天符。反歸平氣。在酉上。爲三合。名曰貴人。邪不可犯。然是歲金位在上。火位在下。名爲逆化。金燥交合。切忌火氣之勝。若火有所勝。水必來救。此年忽有痢疾之生。天氣炎熱。病起於心。氣候清寒。病起於腎。方具于下。丁卯之年。木運不足。下加於卯。雖上受天刑。其

政不減。是爲歲中。忽有風熱之勝。痢疾之生。其鬼在肝。乙酉之年。木受天刑。然是歲火司於地。與木相得。忽於歲中反有風熱之作。方見下。

己卯、己酉年。土運不足。然木受天刑。必難相犯。忽於歲中風濕交爭。痢之所作。其鬼在脾。卯年宜有此候。酉年差減。若有此疾。治之亦同。辛卯、辛酉年。水運不足。反與土同化。而歲水不及。火化妄行。與土相持。勝熱客於胃。多下赤痢。忽作便血。土勝則濕火而注下赤白。是歲若有痢疾之生。一起於心。一起於脾。有方治之。具見於下。

甲辰、甲戌、丙辰、丙戌之年。寒濕過多。火氣見濕。庚運之年。清化亦甚。是歲運氣。與天水相生。與地土相得。巳上年辰。痢疾之生。切爲大害。不可妄投涼藥。戊辰、戊戌之年。水火相戰。壬辰、壬戌之年。土木相攻。所生之痢。其證自各不同。方具於下。

乙巳、乙亥之年。金運不足。無能與天相犯。乃與少徵同化。丁巳、丁亥之年。上爲天符。木化之甚。己巳、己亥之年。木能制土。脾將受邪。辛巳、辛亥之年。水運不足。與土化同。土木相攻。脾氣偏弱。癸巳、癸亥。不足之火。與天相得。與地相符。火致政不減。是痢疾所生。起在肝心。方並見下。以運言之。猶且未足。予請以六氣推之。子午年、丑未年、寅申年。四月、五月。火土相交。辰戌年。四月、五月。水火相犯。巳亥年。四月、五月。木土相攻。卯酉年。四月、五月。金火相持。水若相救。邪乃犯心。子午年。六月、七月。土火相鬱。卯酉年。六月、七月。水火相犯。辰戌年。六月、七月。土木相攻。巳亥年。六月、七月。火土相持。巳上年月。忽生痢疾。皆隨其月氣、

相攻而成也。善爲醫者。先治其鬼。其病自愈。議者謂六氣推遷。於十二月中各紀一步。今獨舉四月、五月、六月、七月兩氣。以言痢疾何也。答曰。夏秋相交。火金相繼。土水二化。長遊行於其間。土寄於巳。所以生金。火位於申。所以制金。土生於申。所以傳金。水生於申。所以救金。然後夏秋有相承之理。五行六氣。玄妙從此而著。人之痢疾從此五行玄妙中生。是故聖人名之曰大奇之病。予故陳逐年四月、五月、六月、七月之氣候以言之。其餘他氣生痢。皆倣此而推。切以六氣之政化。見之未詳。予請以脈候明之。

若今人之下痢。服涼藥、暖藥。皆不驗。診其脈。脾一指外鼓而沉。此名腸澼。其候非藥力可治。久當自較。但世人有患不驗纏綿經久。却因亂喫一般物。便得安校。此乃正腸澼之候也。今有患痢。診其脈。肝脈一指小而緩。此病輕。治卽愈。今有人患痢。診其脈。腎脈一指小而沉。所下之痢。皆是血痢。此之一病受之非常。治之亦難。血溫身熱者死。方亦見下。今有人患痢。診其脈。肝心脈、脾脈。皆微細。不濇不絕。所下皆是血痢。藥到便安。今有人患痢。其脈微小。再三尋之。又沉而濇。此之一候。若下白痢。其勢雖重。庶幾可治。若是下血。切忌發熱。通身發熱者死。熱見七日死。已上所陳。雖未足以達痢之淵源。亦足以明其粗迹。議者謂。如子所言。自甲子至於癸亥。每六十年中。未嘗有一年不生痢疾。今世人患痢疾。於數年中間。忽止有一年。其故何也。答曰。六十年中。未嘗有一年無水土相攻。未嘗無土火相鬱。未嘗無水火相犯。但五運之政。譬如權衡。一年間五行氣數更相承制。得其平等。則其疾自然不作。忽若一氣大過。一藏有餘。痢疾之生。應不旋踵。予故備陳其粗。以開後學之未悟。庶幾診療之間。無差悟之過者矣。但毒痢傷人不一。惟水邪犯

心爲重。世人初患痢時。先發寒熱。投藥治之。其勢不退。發熱太甚。食則嘔逆。下痢不止。心熱如火。只要入涼處。只思喫冷水。狂走。渾身肌肉疼痛。着手不得。此候、十難治其三四也。治疫痢方。須是子細首尾讀此方論。令分明。識病根源。然後喫藥。但毒痢初得時。先發寒熱。忽頭痛。忽壯熱。忽轉數行便下。赤白相雜。忽止下白痢。忽先下白痢。後變成赤痢。忽先下赤痢。後却變成白痢。宜喫此方。但初下痢時。先發寒熱頭痛。卽是寒邪犯心。寒氣犯心。水火相戰。故初得病先發寒熱。水火相犯。血變於中。所以多下赤痢。如紫草水。如莧菜水。無色澤者。寒邪犯心之重也。先發寒熱。而所下之痢止白色者。寒邪犯心之未重也。先下白痢。而後有赤痢之變者。寒邪犯心。其勢漸加也。先下赤痢。而後變成白痢者。寒邪犯心。其勢漸減也。赤白相等者。□水火相犯。其氣相等。寒濕之氣相搏而成也。忽有赤少而白少。此寒邪之勢有多少。毒痢之病有輕重。以白多爲輕。以赤多爲重。治之之法。先奪其寒。則所下之藥一也。以太歲分之。則丙子、丙午、甲子、甲午、庚子、庚午、丙寅、丙申、年甲寅、甲申年。庚寅、庚申、幷辰戌之年。運過丙申及庚運所臨。其害尤甚。及丑未之年。宜有此候。又更無問太歲。蓋天地變化。其候多端。難可窮盡。今立此方。但世人亦不必椿定太歲。但看一年中春夏之內。多有寒肅之化。陽光少見。忽寒熱二氣更相交爭。忽於夏月多寒濕之化。寒邪犯心。所受之痢。先發寒熱。忽頭痛。忽先轉數行。後有赤痢。忽赤白相雜。忽止下白痢。並宜喫此通神散。喫後取壯熱減退。若兩三盞後。壯熱不退。更不喫此方。自別有論方在下。

麻黃 去根節　**官桂** 去麄皮各三分　**甘草** 各一分炙　**大芎**

白朮各一兩　細辛八銖　獨活　桔梗
防風　芍藥　白芷各半兩　牡丹反去心
牽牛四銖炒

右爲細末每服二錢非時熱湯調下和滓熱喫若喫三兩盞後寒熱不退更勿喫自別有方論在下若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合第二第三方藥喫之取安校若寒熱已退赤痢未消減更服三兩盞然不可多喫一日只兩盞候赤痢消減忽變成白痢漸次修合第二方喫候出後

度數減少便修合第三方喫取平安也但六甲之年六庚之歲春夏之內時氣多寒人得痢疾此藥通神若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢疾先發寒熱卽於方內添草豆蔻一兩修合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒人有痢疾先發寒熱並宜喫此方治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤痢已消減宜進此方還眞散若喫前方藥寒熱未退赤痢未消減更勿進此藥但天地變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡子細故爾

訶子五箇用麵裹火炮熟不要焦得所去麵不使京熱咬訶子破去核不用只仲皮焙乾

右細搗羅爲末每服二錢以米湯一盞半同藥煉取一盞喫若吐出一兩口涎便住如此喫經數盞大府漸安出後減少便修合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥壯熱未退血痢未減不請進此藥

治疫毒痢喫前兩方藥病勢已減所下之痢止餘些小忽青糞忽如鴨糞忽如茶湯如濁油忽只餘些小

淺深紅色。宜喫此方。以牢固大腸。還復眞氣。舶上硫黃丸。

舶上硫黃（一兩。去少石。細研如飛塵。）

右以薏苡仁二兩炒熟。擣爲末。與舶上硫黃相和勻。滴水相和。丸如梧子大。空心。以米湯下五十丸。

治毒痢。初得時。先發寒熱。服前面毒痢方通神散三兩盞。一日忽隔一夜。寒熱不退。下痢不減分數。通身發熱。所下之痢。多是濃涕。如桃花色。如紅米膠。每一次忽下一盞半盞已來。喫此藥二盞三盞。經一日忽一夜。寒熱不退。下痢不減分數。更不進此藥。若依法進藥兩盞。壯熱便退。下痢少減分數。即請漸漸進此藥。每日只兩盞。候赤痢稍減。忽變成白痢。却修合上面還眞散。喫取平安。且痢之有寒熱。其證一也。前方以暖藥解之。此方以涼藥投之。其說何也。答曰。水邪犯心。身能發熱。土濕鬱火。身亦發熱。肝熱刑脾。身亦發熱。惟至精者。識其秋毫之變。切恐世人未能通其妙旨。予因設此兩方。以救其失。然毒痢之傷人。惟水邪犯心最爲極重。但患痢疾之人。有增寒壯熱。先喫上面通神散兩三服。寒熱不退。下痢不止。然後進此藥。以太歲分之。惟六壬、六戊、寅申、巳亥之年。宜有此候。而六戊之年。尙有差變。蓋火盛之年。必有寒濕相犯。故然。以六氣推。深不定。又不可局定年辰。但一年之間。春夏之內。熱氣偏多。濕化不舉。人有痢疾。肝脈弦。心脈洪。然後喫此藥。若喫兩盞後。不見效驗。更勿進服。蓋痢之所起。切忌水之犯心。不可妄投涼藥。故此方兩盞後無驗。更不可服。

荊芥穗　牡丹皮去心　木香　白頭翁

芍藥　桔梗　防風　獨活
地榆各一分　黃連蜜浸一宿火上炙乾使三分　牽牛炒一分

右爲細末每服二錢水壹盞煎一二沸急瀉出食後温和喫之此藥少見效驗更可進服以安爲期然不可多喫一日只兩盞痢才住便得止

治毒痢初得時發寒熱微有小寒熱忽止腹痛出後時糞後有少膠涎與赤痢相雜却自誤喫涼藥漸漸下痢極多從早至暮但只思睡早朝卽顏色枯瘁身體稍涼近晚至夜卽面色赤顏色光潤下痢極多皆是清涎與赤痢相雜通身發熱不思飲食渾身肌肉着床則痛據此候宜當喫此藥但身體大熱如火與人相近則熱氣逼人其脈輕微輕手取之散滿指下不分部位全無骨力指下如風如氣重手取之指下全無急用訶子五箇炮制如下面法擣羅爲末爲一服先用熱米湯調和滓熱服吐出涎脈氣方生可進下面方

白朮半兩　白芷　芍藥　大芎各一分
甘草四錢炙　訶子五箇麵裹炮熟去麵吹碎去核用肉焙乾

右細擣羅爲末每服三錢熱陳米湯調下和滓喫

治毒痢初得病時並無寒熱所下之痢全是濃血忽黯血左右三部脈氣皆微細宜喫此方

桑寄生壹兩　防風　芎各一分　甘草四錢炙

右擣羅爲細末。每服二錢。水一盞。煎八分。空心。和滓喫。

治赤白痢。初得時。並無寒熱。忽患赤白痢。經久未較。別無增寒壯熱。宜此方。

淡豉十箇　黃連四十九枚。每枚長一粒飯許

右件。用新埳瓶一箇。安藥在內。以新片瓦蓋瓶口。大火煅通赤後。煙絕取出。就熱研如飛塵。每服二錢。熱鹽米湯調下。和滓服。應是赤白痢。無問赤多白少。但身體無增寒壯熱者。皆可喫此方。

治赤痢。或赤白相雜。初得時。並無增寒壯熱。經及數日身體不熱。只聞小腹內躁熱。下血不止。或止血便暖。藥不見驗效。宜服此方。寅申巳亥年。六壬之年。宜有此候。但喫兩盞後不見效。更不請喫此藥。但脣皮赤。忽腫黯色。小便黃白。身體涼。夜間則發熱。如此。卽肝熱刑脾之證也。

荊芥穗　牡丹皮去心　白頭翁　地榆

芍藥　防風　桔梗各一分　黃連壹分

牽牛炒熟三銖　木香三銖

右擣羅爲細末。每服二錢。水壹盞。煎兩沸。食後。和滓溫服。須是一年之間。春夏之內。風熱太甚。分明識其痢疾定是伏熱方可進此藥。

治下赤痢。身體並無增寒壯熱。此名肝心變癖。

黃連一兩蜜浸一宿。炙令香熟。　木香三銖

右爲細末濃煎陳米湯調下二錢食後和滓服

治赤痢不止其脈反微小沉而又濇其身熱者死熱七日死此候極危困但喫上面通神散一兩盞發熱便退亦庶幾可治便修合上面還眞散舶上黃丸喫取安校若喫通神散後發熱不退難治之也

治患赤痢赤白忽因先寒瘧後變成痢忽因患痢後却變成寒瘧但疾痢時無問赤白若有增寒壯熱並宜喫上面通神散喫了熱壯已退便修合還眞散舶上黃丸喫取安校緣此證候乃水邪犯心治之不可輕也

桑寄生半兩　地榆　芎　防風各一兩
人參　黃橘皮各一兩　甘草炙　木香各三錢
白蒺藜半兩炒去尖

右爲細末每服二錢水壹盞煎取八分和滓喫服經數日外仍修合暖益脾藥喫

治小兒疳痢所下之痢多黃沫白涕但髮稀面黃腹大忽非時泄瀉不成肌肉宜喫此方

使君子半兩蒸三度　訶子一兩煨裹炮去核使肉　白薇黃　葶藶
芎　檳榔　肉豆蔻　木香各一分

右爲末每服一錢半空心倉米湯調下量兒大小服之

治小兒肝受疳氣相刑於脾所下之痢多是鮮血忽是膿血忽赤白相雜宜此方

防風　地榆　芎

史君子半兩，蒸四五回，焙。　木香　甘草各三錢，炙。

右爲細末，每服壹錢半，非時或食後任意，煎點冷喫。

治痰嗽，益眞丸。

人參　黃耆　吳白朮各半兩　白蒺藜去刺，各一分。

熟乾地黃六錢　鱉甲四錢炒成　當歸去苗　黃連四錢二十四銖爲一兩。

白芍藥　阿膠珠子　鹿角霜各三錢　木香壹分

枳實一錢，炒。　白芍藥　桑寄生二錢

右爲細末，煉蜜丸如梧子大，非時，清湯下三十丸，一日兩服。

治氣弱腹結。

白朮半兩　人參壹錢　大芎

藿香　半夏　陳橘皮各一分

草豆蔻各一分　薏苡仁半兩　厚朴三錢，酥塗炙焦。　甘草炙

右爲細末，空心水壹盞，薑三片，棗二箇，破之，同煎七分，去滓服。

治心氣動，肝脈虧。　茯苓三分

天南星二錢，炮。

桑寄生壹分　茯苓　防風　獨活

甘草炙　槐角　枳實各一分炒　木香壹錢

白蒺藜妙去刺　人參各半兩　白朮七錢以性涼維添

右爲細末每服三錢水一盞磨沉香少許煎七分

治精血皆虛鹿茸丸

血茸半兩用酥微炙　五味子　山藥各一兩以上三件爲末　白蒺藜三錢合研

右煉蜜和作一塊收甕合中臨時丸每服三十丸食前溫酒下

治肝腎氣虛外應目不榮宜服此足精丸

好熟乾地黃須是蒸九遍用酒製造者　當歸去苗　白芍藥

人參　山藥各半兩　茄茸酥炙去皮七錢　五味子六錢

川椒去目一錢半　青木香　獨活　甘菊各三錢

白蒺藜　杜仲去皮酥炙　兎絲子酒浸一宿　黃耆各半兩

大芎　肉蓯蓉各四錢

右爲細末煉蜜丸如梧子大空心濃煎糯米湯入鹽少許下五十丸

又服洗肝散

天麻半兩酒浸一宿濕紙裹煨　白殭蚕去口去絲　天南星一炮各一分　芎二錢

黄耆　薏苡仁　白芍藥各半兩　白蒺藜去刺四分

甘菊　甘草炙　人參各三分　木香一錢半

沉香煎時磨少許

右爲細末水一盞薄荷二葉磨沉香少許同煎藥之時取七分去滓服日進二三服每服二錢

補心氣人參散

人參七錢　伏神　山藥各半兩　白芍藥

黄耆　熟乾地黄各一分　防風一分半　甘草一分炙

官桂去皮一分半　天南星炮過二分

右爲細末每服二錢水一盞生薑少許煎七分

司業六脈滿而不實寸口倍於人迎尺脈

血濁而氣浮宜清血抑肺氣如此卽隔通而氣歸於下不可服燥烈之藥第一方

人參七錢好者　陳橘皮去白一分半　白茯苓　麥門冬去心三錢

桔梗　紫菀　防風各一分　黄耆

前胡　白芍藥各一分　木香一分半　白蒺藜去刺

桑白皮各半兩　甘草二錢炙　大腹皮半箇

右爲細末每服三錢非時或食後少時水一盞磨沉香少許生薑一片同煎八分初服三四服覺膈快便不須服却只常服丸子候三兩日間覺似瘥卽進一服此散子不常服

又方

天麻麵裹煨　肉蓯蓉酒浸一宿　熟乾地黃好者　兎絲子酒浸一宿

山藥　栢子仁各半兩　萆薢　茯苓

白芍藥各半兩　牛膝去頭四分　人參七錢　枳實一分麵炒過

木香一錢半

右爲細末搗薏苡仁爲粉煮作稀糊丸如梧子大陰乾每日空心濃煎糯米湯入鹽下五十丸

治小兒腹中有氣不散而藏府微澁夜有盜汗

史君子三錢　京三稜　萆薢　白茯苓

鱉甲　人參各一分　黃耆壹錢　獨活二分

肉豆蔻二箇　木香一錢半　甘草二錢

右爲細末非時水半盞煎二錢煉取三分去滓服覺氣散則已之不可多服

治小兒瀉本因傷水

訶子　白朮　白芍藥各一分　甘草炙
蒺藜　獨活　厚朴去皮各二分　黃連半分炒

肉豆蔻壹枚

右爲麄末煎一錢許去滓服水七分煎至半盞久便血

黃連一錢半炒焦　白蒺藜去刺半兩　槐花炒焦　獨活
訶子炮取肉　枳實炒焦　荆芥穗　臺荆子各一分
木香一錢半　白芍藥三分　甘草二錢炙

右爲細末食後水一盞煎三錢匕取七分和滓服或煉蜜丸如梧子大清湯下三四十丸無時日一服或二服

治小兒急慢驚風

人參半兩好者　天麻炮　天南星炮　黃耆
芎各二錢　薏苡仁　獨活　伏神
臺荆子各一分　鱉甲酥炙黑　木香各一分半　甘草壹分
半夏壹製一錢半　乾蠍四箇全者用糯米同炒米熟爲度　麝香同朱砂研

朱砂令兩臨脈旋入少許

右爲細末如飛塵入朱砂麝香少許每服二錢同煎三四沸與三匙頭如更發數即添麻黃一味幷煎服不入麻黃如大府冷即添白朮末一二豆粒許同煎小兒藥宜服細末取其氣液之全唯是止瀉劑乃作丸耳

治血滯精虛肛門痒痛成痔

白歛　黃耆炙各半兩　槐花微炒　茯苓

白芍藥　甘草炙　當歸去苗各一分　南木香錢半

枳實錢半炒焦　白蒺藜三錢

右爲篩末非時水一盞煎三四錢匕取八分去滓服每日空心先服鹿茸青鹽丸方在前却日進三四服以去痔根初服只一二服俟服青鹽丸及旬日自然可載此藥後續進兩三服二藥相兼而進久可以去其根本下血日多即令人心悸無情緒意思不悅宜戒酒慎護病雖已止宜服此二藥

服藥若痔根已安藏血未止即更服後方

新活鯽魚壹箇重四五兩以上者去腸不去鱗　白礬三兩微敲研　槐花半兩

蒲黃壹分

右袞合同納於魚腹中納藥了以線繫之入一埳合中外以鹽泥固濟乾十斤炭蔟之火盡取出細研如

塵蒸餅丸如梧子大非時米湯下二三十丸一日一兩服

少陽相火之復與水爭戰耳痛方

官桂去皮三錢　白芍藥　白茯苓

防風　甘草炙　羌活　桔梗

麥門冬去心各一分　黃耆半兩　山茵陳二錢　麻黃去節

右爲麄末每服三錢水一盞生薑兩片煎至七分去滓服日三如不痛更不消服只進補腎藥小兒臟寒泄瀉不止豆蔻丸

草豆蔻一枚剝開皮入乳香一塊在內復用和白麵裹慢火燒令熟去麵及豆蔻皮不用

右爲細末以粟米飲丸如麻子大每服五七丸米飲下無時

治婦人骨蒸方

桑白皮　黃耆　薏苡仁各半兩　茵芋

紫蘇葉　茯苓　甘草各一分炙　官桂去皮二分

大腹皮一錢半　陳橘皮三錢

右爲細末每服四錢水壹盞薑三片煎八分服之三四日却服後方

微利不妨如脚未消卽間用豆湯服一服

又方

牛膝去頭酒浸一宿　當歸去苗　茯苓　熟乾地黃

薏苡仁　黃耆　巴戟去心各半兩　栢子仁

鱉甲酥炙　芎各一分　桑螵蛸三分

右細末煉蜜丸如梧子大空心鹽湯下五十丸

小兒泄厚腹丸

地榆　天麻　芎　赤石脂各一分

訶子皮　削朮各三分　厚朴去皮一分薑炙　木香半分

右爲細末棗肉爲丸非時服三十丸

治久瀉方

白朮半兩　白芍藥半兩　桔梗壹分　白芷半兩

右爲細末以猪肝四兩片切如食法入少鹽和之不用油用藥先和一半於銚內先煿過次用木炭火上炙乾再傅末作兩三次食之止泄最妙

又方新製

人參壹兩　黃耆　薏苡仁　糯米末

阿膠炒　木香　茯苓　半夏如法製

甘草炙　鱉甲酥炙各一分　白朮半兩　肉豆蔻大者兩箇

右爲細末不羅非時以水一盞生薑一片棗子一箇破之同煎三錢取七分服去滓服至十來服或七八服覺血淡或微有些小腹痛每服加白朮少許及烏梅肉半箇煎但血旋止和胃藥藥未可全去只桔梗枳實二味以白蒺藜代之

痢稍止未全減藏府忽下血猶未止却服此方

黃耆輕炙　白蒺藜去刺各半兩　白歛

槐花微炒　獨活各一分　訶子皮四錢　茯苓

黃連燒焦二錢　木香壹分

右爲末煉蜜丸如梧子大非時清湯下二十丸至三十丸米湯亦得

又方

訶子炮令大熟　山藥　人參　白朮各半兩

熟乾地黃一兩半地黃最能補而去肝氣但通腸於利藥中使非訶子不能爲功　木香壹分

桑寄生壹分

右爲末煉蜜丸如梧子大空心米湯下三十丸常服以去痔疾又能足血

王雲五主編

書叢集成初編

史載之方

中華民國二十八年十二月初版

撰者　史堪

發行人　王雲五　長沙南正路

印刷所　商務印書館

發行所　商務印書館　各埠

（本書校對者王永榜）

G一六一九上